Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1	L100000	*1,25-Dihidroksi Vitamin D	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalseminin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi veya kronik renal yetmezlikli hastaların takibi, vitamin D bağımlı rikets, vitamin D rezistans rikets (familial hipofosfatemi)	CLIA	Salı saat 09:00 (Pazartesi 18:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat18:00:00
2	L100160	*11-Deoksikortizol	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - ZamanBuzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Konjenital adrenal hiperplazi, hirsutismus	RIA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma	4 iş günü içerisindesaat 18:00
3	L100190	*17 OH-Progesteron	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.3 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Adrenogenital sendrom şüphesi	CLIA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma	4 iş günü içerisindesaat 18:00
4	L100180	*17-Hidroksikortikoidler (17-Ketosteroidler)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün	Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Çarşamba saat:12:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat18:00:00
5		*2,5-Hekzandion	Numune tipi - Miktarı İdrar - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 günOrtam - 5 gün	Hegzan maruziyeti takibi	GC MS	Çarşamba saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Bir hafta sonra saat 18:00
6	L100220	25 OH Vitamin D	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma/Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 7 gün	Vitamin D eksikliği, osteoporoz	CLIA	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Aynı gün 3 saat sonra
7		*3-Methoxytyramin	Numune tipi - MiktarıEDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL)(Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalıve DONDURULARAK gönderilmelidir.)Sıcaklık - ZamanBuzdolabında - 8 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat		LC-MS/MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
8	L100130	*5'- Nükleotidaz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 4 Saat	Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
9	L100090 (24 Saatlik idrar) L100080 (Spot İdrar)	*5-Hidroksi Indol Asetik Asit (5-HIAA)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 3 mL) Not: 24 saatlik idrar asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 56 gün Dondurulmuş - 365 gün	Karsinoid sendrom şüphesi Not: serotoninden zengin gidalar (Örn. Avakado, muz, patlıcan, ananas, domates, ceviz, erik) ve bazı ilaçlar serotonin metabolizmasını etkileyebilmekte ve İdrarı toplamaya başlamadan 3 gün önce bunların alımı durdurulmalıdır.	LC-MS/MS	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
10	L100880	*ACE(Angiotensin Converting Enzyme)	Numune tipi - Miktarı Serum veya Heparinli plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (EDTA'lı plazma kabul edilmez.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün	Sarkoidozis, silikozis,asbestozis, Gaucher hastalığı	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
11	L100880	*ACE, Bos	Numune tipi - Miktarı BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün	Nörosarkoidoz	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
12	L100270	*ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 2 saat	Addison, Cushing sendromu, ektopik ACTH üretimi	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
13	L104010	*Açilkarnitin Analizi (Tandem Ms)	Numune tipi - Miktarı Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire) Not: Erken teşhisin faydasını en üst düzeye çıkarmak için, örnek 12 saatten sonra ve 1 haftalıktan önce mümkün olduğunca erken toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Yağ asidi oksidasyon defektleri	LC-MS/MS	Pazartesi-Cuma (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
14	906320	*Adacık Hücre Antikoru (Islet cell antikoru- ICA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 2 gün	Tip I Diabetes Mellitus	CLIA	Salı ve Perşembe	7 iş günü içerisinde saat 18:00
15	912680	*Adenovirus IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 2 gün	Serumda adenovirus antikorunun (IgG) gösterilmesi	EIA	Salı saat:12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
16	912690	*Adenovirus IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 2 gün	Serumda adenovirus antikorunun (IgM) gösterilmesi	EIA	Salı saat:12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
17	907370	*Adenovirüs Antijeni	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 1 g) Not: Gaita numunesi dondurularak gönderilmelidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat	Gastroenterit oluşturan adenovirus enfeksiyonları	Immunokromotoğrafik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
18	L100230	*Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)	Numune tipi - Miktarı Serum, Plevra mayi, BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Dondurulmuş - 6 ay Ortam - 1 gün	Adenozin deaminaz bir çok farklı malignansi ve infeksiyonda Seruma salınan bir endojen doku enzimidir. Karaciğer sirozu ile ilişkili portal hipertansiyonda en yararlı tek testtir. Plevral sıvıda artmış ADA düzeyleri sıklıkla tüberkülozla ilişkilidir. Tüberküloz menenjitinde BOS ADA düzeyleri artar.	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
19	L100920	*ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin)	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 24 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 2 saat	Diabetes insipidus, SIADH (uygunsuz ADH sekres-yonu sendromu), ektopik ADH üretimi	RIA	Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	3 gün sonra saat 18:00
20	L104070 (24 Saatlik İdrar) L104060 (Spot İdrar)	*Adrenalin (Epinefrin), İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Not: 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi,Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Ertesi gün saat 18:00
21	L104050	*Adrenalin (Epinefrin), Plazma	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat	Adrenalin (Epinefrin), Plazma Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
22	L101050	*Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 2 saat	Pıhtılaşma inhibitörlerinden koagülasyon faktörü eksikliklerinin ayırt edilmesine yardımcı olmak için kullanılır.	Koagülometrik	Hafta içi her gün	Aynı gün saat 18:00
23	911360	*ALA (Aminolevulinik asit)	Numune tipi - Miktarı 24 saatlik idrar - 5 mL (min 3 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün	Kurşun zehirlenmesi, porfiria (Sonçlar profirin sonucu ile birlikte verilmektedir.)	EIA	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
24	L100300	Alanin Aminotransferaz (ALT)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Karaciğer, safra kanalı bozuklukları	Kinetik UV	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
25	L100320	Albumin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (2-8°C) - 30 gün 15-25°C - 7 gün	Karaciğer ve böbrek hastalıkları, hepatosiroz, yanıklar	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
26	L100350	*Albumin (BOS)	Numune tipi - Miktarı BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 8 saat	Demiyelinizan hastalıklar, subaraknoid kanama, SSS inflamasyonu	Türbidimetrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
27	L100370	*Aldolaz	Numune tipi - Miktarı Serum, Kırmızı Kapaklı (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün	Miyopati, miyokard infarktüsü ve şiddetli hemolitik anemi vakalarında yükselir	Fotometrik	Pazartesi (16:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Aynı gün saat 18:00
28	L100380	*Aldosteron	. Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 28 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün ortam - 4 gün	Hipertansiyon, adrenokortikal hiperplazi, Conn send-romu, adrenokortikal yetersizlik NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanmalıdır	CLIA	Salı, Perşembe ve Cumartesi	4 iş günü içerisinde saat 18:00
29	L100400	*Aldosteron (İdrar)	Numune tipi - Miktarı 24 saatlik idrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 28 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün ortam - 4 gün	NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanılmalıdır.	RIA	Salı, Perşembe ve Cumartesi	6 iş günü içerisinde saat 18:00
30		*Alerji Beslenme (Türkiye) Paneli	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	LIA	Cuma Saat 09:00 (09:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
31		*Alerji Çocuk (Türkiye) Paneli	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	LIA	Cuma Saat 09:00 (09:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
32		*Alerji Solunum (Türkiye) Paneli	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	LIA	Cuma Saat 09:00 (09:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
33	L100410	*Alfa-1 Antitripsin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün ortam - 28 gün	İnfantil hepatosiroz, pulmoner amfizem	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
34	L100680	*Alfa-Fetoprotein (AFP)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Primer karaciğer karsinomu, germ hücre tümörleri	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
35	L100710	Alkalen Fosfataz (ALP)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2-25°C - 7 gün	Karaciğer, safra kanalı ve kemik hastalıkları, kemik metastazları	Kinetik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
36	L100740	*Alkalen Fosfataz (Kemiğe Spesifik)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 60 gün Ortam - 1 gün	Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizm	Fotometrik	Pazartesi saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
37	L100730	*Alkalen Fosfataz İzoenzimleri (ALP İzoenzim Elektroforezi)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 360 gün Ortam - 1 gün	Alkalen fosfataz artışının nedenini belirlemek	Elektroforez	Laboratuvara danışınız	Laboratuvara danışınız
38	L100760 (Serum) L100770 (24 Saatlik idrar)	*Alüminyum	Numune tipi - Miktarı Heparinli lacivert kapaklı tüpe alınmış serum numunesi - 1 mL (min 0.5 mL); İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Not: Alüminyum serum testlerinin sonuçlarının sağlıklı çıkması için numunelerin sodyum heparinli lacivert kapaklı eser element tüpüne alınıp gönderilmesi gerekmektedir. Önerilen tüp markası : VACUETTE® TUBE 6ml NH Trace Elements Sodium Heparin Item No.: 456080 Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 7 gün	Mesleki maruziyet, alüminyum tedavisi (diyaliz hastaları)	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
39	L100800	Amilaz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 7 gün	Akut pankreatit, parotitis	Kinetik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
40	L100820 (24 Saatlik idrar)	*Amilaz (24 Saatlik İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Akut pankreatit, parotitis	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
41	L100810 (Spot idrar)	*Amilaz (Spot İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Akut pankreatit, parotitis	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
42	L100840	*Amiloid A	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 7 gün	Akut faz reaktanı,bir çok kanser için prognostik faktör	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
43	L109350	*Amino Asitler (BOS)	Numune tipi - Miktarı BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Amino asit metabolizması bozuklukları (24 adet ami-noasit çalışılmaktadır)	LC-MS/MS	Çarşamba-Cuma (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
44	L109350	*Amino asitler (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 70 gün	Amino asit metabolizması bozuklukları (24 adet ami-noasit çalışılmaktadır)	LC-MS/MS	Çarşamba-Cuma (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
45	L109350	*Amino Asitler (Serum/Plazma)	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma/Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün	Amino asit metabolizması bozuklukları (24 adet ami-noasit çalışılmaktadır)	LC-MS/MS	Çarşamba-Cuma (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
46	907350	*Amip Antijeni (Entamoeba H.)	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 2.5 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün	Gaitada parazit antijenlerinin araştırılması	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
47	907360	*Amip Antikoru (Entamoeba H.)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün	Bu test bağırsak enfeksiyonu için faydalı değildir, ancak amebik karaciğer apsesi tespitinde yardımcı olabilir.	ELISA	Salı Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
48	L100860	*Amonyak (NH3)	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma- 1 mL (min 0.5 mL) NOT-1: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. (Heparinli plazma kabul edilmemektedir.) NOT-2: Bu test için evde kan alımı yapılmaz, hasta laboratuvara gelmelidir. Numuneler hemen buza konulmalı ve analiz 20-30 dak içerisinde gerçekleştirilmelidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 24 saat	Hepatik koma, metabolik karaciğer yetmezliği	Fotometrik	Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe, Cum a ve Cumartesi	Dört saat sonra
49	906770	*ANCA Tarama (c-ANCA, p-ANCA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Granulo- matozis, mikroskopik poliangitis)	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
50	L100010	*Androstenedion	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Hirsutizm, polikistik over, Stein- Leventhal sendromu	CLIA	Salı, Perşembe ve Cumartesi	4 iş günü içerisinde saat 18:00
51	907101	*Anti - CCP (Cyclic Citrullinated Peptide)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.4 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Romatoid artrit	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
52	L100890	*Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması		Salı ve Perşembe günleri saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün sonra saat 18:00
53	L100900	*Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması	EIA	Salı ve Perşembe günleri saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün sonra saat 18:00
54	L100910	*Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması	EIA	Salı ve Perşembe günleri saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün sonra saat 18:00
55	906400	*Anti DNAse-B	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Streptokoklar tarafından üretilen desoksiribonükleaz B'ye karşı üretilen antikorlardır. Mevcut veya geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonlarının (roma-tizmal ateş, tonsillit, glomerülonefrit vb.) tanısında kullanılır.	EIA	Ertesi gün sonra saat 18:00	Salı günleri çalışılır
56	906410	*Anti ds-DNA Tarama	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Sistemik lupus eritematoz (SLE)	EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
57	906420	*Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Tip 1 otoimmün hepatit	IFA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00 (Cuma çalışılan örnekler için Pazartesi saat 18:00)
58	906430	*Anti Endomisyum Antikor IgA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 14 gün	Glutene duyarlı enteropati	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
59	906430	*Anti Endomisyum Antikor IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 14 gün	Glutene duyarlı enteropati	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
60	L114222	*Anti Faktör Xa	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 8 Saat	Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi	Koagülometrik	Hafta içi her gün 15:00 Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
61	906490	*Anti Gliadin IgA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Çölyak (Celiac) hastalığı ve dermatitis herpetiformis	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
62	906500	*Anti Gliadin IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Çölyak (Celiac) hastalığı ve dermatitis herpetiformis	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
63		Anti HAV Total	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (0.5 mL) Kap/Kapak : Sarı Transport / Saklama Koşulları : 2-8°C	Hepatit A virusu (HAV) fekal-oral ve yakın temas ile bireyden bireye bulaşır. Kontamine su ve gıdalar aracılığıyla salgınlar görülebilir. Çocuklarda hafif seyirli hastalık bulguları oluşurken, erişkinlerde daha gürültülü bir tablo yapabilir. Halsizlik, baş, eklem, kas ağrıları, ateş, idrar renginde koyulaşma, sarılık gibi bulgularla seyreder. Virüs, klinik bulgular başladıktan sonraki bir haftalık dönem boyunca dışkıda bulunur ve bu dönem de hasta infeksiyonu diğer bireylere bulaştırma potansiyeli taşır. Klinik bulguların görülmesini takiben 1-2 hafta içinde anti-HAV IgM ve 2-4 hafta içinde de anti-HAV IgG Antikorları ortaya çıkar. Akut hastalığın tanısı, virusa karşı gelişen IgM'lerin saptanmasıyla konulur. IgM sınıfı antikorlar 3-6 ayda kaybolur. Anti-HAV IgG ise ömür boyu kalıcıdır ve ömür boyu koruyuculuk sağlar. Anti-HAV IgG pozitifliği geçirilmiş infeksiyonu veya aşılama sonucu oluşan bağışıklığı gösterir.	ECLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
64	906640	Anti HCV	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	HCV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Genelde HCV enfeksiyonunun geç evresinde kanda bulunur. Anti-HCV'nin bulunması immüniteyi sağlamaz. Pozitif sonuçlar diğer yöntemlerle doğrulanmalıdır.	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
65	906650	*Anti Hepatit E (HEV)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 21 gün	Akut hepatit E	EIA	Cuma günü saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
66	906720	*Anti Jo-1	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Dermatomiyozit, polimiyozit	EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
67	906980	*Anti Jo-1 (Immunblot)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Dermatomiyozit, polimiyozit	Immunblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
68	906750 Bkz. Anti TPO Bkz. Anti TPO ECLIA Bkz. Anti TPO Bkz. Anti TPO	*Anti mikrozomal antikor	Anti TPO Bkz.		Anti TPO Bkz	Anti TPO Bkz	Anti TPO Bkz
69	906770	*Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profil	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Bkz. ANCA tarama	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
70	906790	*Anti Pariyetal Antikor (APA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Kronik atrofik gastrit, pernisiyöz anemi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
71	906790	*Anti Pariyetal Antikor (APA) (IFA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Kronik atrofik gastrit, pemisiyöz anemi	IFA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00 (Cuma çalışılan örnekler için Pazartesi saat 18:00)
72	L100650	*Anti Plazmin	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 8 Saat	Herediter homozigot antiplazmin eksiklikleri ciddi kanamalarla seyreder. Heterozigotların %30- 50'sin-de orta dereceli kanama bozuklukları gözlenir. Bu test çoğunlukla alfa-2 antiplazmin olmak üzere antiplazmin fonksiyonunun ölçümünü yapmaktadır. Alfa-2 makroglobülinden hafifçe interfere olmaktadır. Konjenital eksiklik, ciddi KC hastalıkları, DIC ve bazı tümörlere bağlı fibrinojenoliz durumlarında düşerken diabetes mellitüsde yükselir.	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
73	906800	*Anti Ribozomal P Protein	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	SLE, Romatoid artrit	IFA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
74	906860	*Anti Sentromer	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Bkz. Anti centromere B	Immunblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
75	704550	*Anti Sperm Antikor (AsA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	İnfertilite nedeninin araştırılması	EIA	15 günde bir Cuma saat 12:00(Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
76	905610	*Antibiyotik Duyarlılık Testi	Numune tipi - Miktarı Genç bakteri suşu	Üretilen bakterinin hassas olduğu ilacı bulmak	Disk difüzyon	Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
77	906450	*Anti-Fosfatidil Serin IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
78	906460	*Anti-Fosfatidil Serin IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
79	906470	*Anti-Fosfatidil Serin IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
80	906480	*Anti-Fosfolipid İgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
81	906960	*Anti-GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikorları)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Tip 1 diabetes mellitus, otoimmün poliglandüler hastalıklar	CLIA	Salı ve Perşembe	7 iş günü içerisinde saat 18:00
82	L102870	*Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 2 gün	Goodpasture sendromu	ELISA	Çarşamba saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Perşembe saat:18:00
83	906580	*Anti-HBc IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün Ortam - 1 gün	Akut hepatit B	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
84	906560	*Anti-HBc Total (IgG)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün Ortam - 1 gün	Kronik veya geçirilmiş hepatit B	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
85	906600	*Anti-Hbe	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün Ortam - 1 gün	Kronik veya geçirilmiş hepatit B	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
86	906620	Anti-Hbs	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün Ortam - 1 gün	Hepatit B'den iyileşme, immünite kazanma	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
87	906640	*Anti-HCV	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Akut ve kronik hepatit C	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
88	907470	*Anti-HCV Micro Elisa	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Akut ve kronik hepatit C	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
89	906700	*Anti-Histone	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 21 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 21 gün Ortam - 1 gün	İlaca bağlı lupus eritematoz	EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
90	906710	*Anti-İnsülin Antikoru	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Tip 1 diabetes mellitus	CLIA	Salı ve Perşembe	7 iş günü içerisinde saat 18:00
91	906730	*Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 1 gün	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
92	906740	*Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 1 gün	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
93	906760	*Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA M-2)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 1 gün	Primer bilier siroz	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
94	906760	*Anti-Mitokondrial Antikor (AMA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 1 gün	Primer bilier siroz	IFA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00 (Cuma çalışılan örnekler için Pazartesi saat 18:00)

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
95		*Antimon	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL), İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Antimon maruziyetine bağlı akut zehirlenmenin tanısı	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
96	L100960	Anti-Müllerian Hormon (AMH)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş(tercih edilir) - 90 gün	Menopoz durumunun değerlendirilmesi ve over yetmezliğinin araştırılması	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
97	906780	*Anti-Nükleer Antikor (ANA) (Elisa)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Otoimmün bağ dokusu hastalıkları, SLE	ELISA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
98	906780	*Anti-Nükleer Antikor (ANA) (IFA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Otoimmün bağ dokusu hastalıkları, SLE	IFA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
99	906850	*Anti-Scl 70	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Skleroderma	EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
100	906990	*Anti-Scl 70 (Immunblot)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Skleroderma	Immunblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
101	906870	*Anti-Sm	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	SLE	EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00
102	907000	*Anti-Sm (Immunblot)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	SLE	Immunblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
103	907010	*Anti-Sm/RNP	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Mikst konnektif doku hastalığı, SLE	EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
104	907010	*Anti-Sm/RNP (Immunblot)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Mikst konnektif doku hastalığı, SLE	İmmunblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
105	906880	*Anti-Tiroglobulin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Hashimato tiroiditi, primer miksödem, Grave's hastalığı	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
106	L107060	*Anti-TPO (Tiroid Peroksidaz Antikorları)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 2 gün	Hashimato tiroiditi, Hipotiroidizm, Grave's hastalığı, poliendokrinopati	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
107	L100990	*Antitrombin III Aktivite	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 8 saat Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 4 saat	Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü, karaciğer hastalığı, protein kaybı, oral kontrasep-tif kullanımı	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
108	L101000	*Apolipoprotein A	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 24 saat	Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi	Türbidimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
109	L101030	*Apolipoprotein B	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 24 saat	Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi	Türbidimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
110	L101070	*APTT-LA	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 2 saat		Koagülometrik	Hafta içi her gün	Aynı gün saat 18:00
111	L105520	*Aquaporin-4 (Anti-NMO)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Bos - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Multipl Skleroz	IFA	Ertesi gün saat 18:00	Perşembe Saat 09:00 (Çarşamba 18:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)
112	905760	*ARB Aranması (Tüberküloz/Mikobakteri kültürü ile beraber istenmesi gerekmektedir. Tek başına çalışılmamaktadır.)	Numune tipi - Miktarı Balgam, bronşiyal lavaj, idrar - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 24 saat	Tüberküloz	Mikroskobik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
113	L101160	*Arsenik	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
114	L101190	*Arsenik, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
115	L101170 (24 Saatlik İdrar)	*Arsenik, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 72 Saat	Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
116		*ASCA IgA (Saccharomyces Cerevisiae Antikorları)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 2 gün	Crohn's hastalığı	EIA	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Kabul yapıldıktan 2 gün sonra sonuçlanır
117		*ASCA IgG (Saccharomyces Cerevisiae Antikorları)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 2 gün	Crohn's hastalığı	EIA	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Kabul yapıldıktan 2 gün sonra sonuçlanır
118	L114010	*Asetaminofen (Parasetamol)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 1 gün	Tedavi takibi, ilaç intoksikasyonu	LC-MS/MS	Salı-Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
119	906340	*Asetilkolin Reseptör Antikor (ACRH)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Miyastenia gravis, müsküler asteninin ayırıcı tanısı	RIA	Pazartesi ve Çarşamba	7 iş günü içerisinde saat 18:00
120	L101250	*Asit Fosfataz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 5 gün	Prostat kanseri, kemik metastazları	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
121	L100980	ASO (Antistreptolizin O)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulo-nefrit	Türbidimetrik	Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
122	L101280	Aspartat Aminotransferaz (AST)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 7 gün	Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası hastalıkları	Kinetik UV	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
123	900590	*Bakır (Eritorist içi)	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 28 gün	Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı	AAS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
124	L101350 (24 Saatlik idrar) L101340 (Spot idrar)	*Bakır (İdrar)	Numune tipi - Miktarı 24 saatlik idrar - 10 mL (min 0.4mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 28 gün (tercih edilir) Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı	AAS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
125	L101330	*Bakır (Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum (Lacivert kapaklı tüp) - 3 mL (min 2.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün	Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı	AAS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
126	905700	*Bakteri Tanımlama	Kültürde üremesi olan bakterilerin izolasyonu yapılır. Numune tipi - Miktarı Kültür Materyali Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Kültürde üremesi olan bakterilerin izolasyonu yapılır.		Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
127	L114840*1 0	*Lenfosit immünfenotip tayini (CD45, CD14, CD3, CD4, CD8, CD19, CD3-16+C3956, CD15)	Numune tipi - Miktarı Bronko alveolar lavaj sıvısı (BAL) - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 3 gün	Akciğer tüberkülozu, sarkoidoz	Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
128	905675	Balgam Kültürü	Numune tipi - Miktarı Balgam Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Akciğer, alt solunum yolu enfeksiyonları	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
129		*Baryum (Ba)	Numune tipi - Miktarı Serum (Lacivert kapaklı tüp) - 3 mL (min 2.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Spot idrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 3 gün Dondurulmuş - 6 ay	Baryum maruziyeti, baryum toksisitesi	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
130		*Benzen	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Benzen Çalışma ortamında benzen üreten veya kullananlar benzene en yüksek düzeylerde maruz kalırlar. Ayrıca yapıştırıcılar, boyalar, mobilya cilalarıgibi benzen içeren ürünlerin buharları veya gazlarına maruz kalma ve sigara içilmesi ile benzene maruz kalınabilir.	GC MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	7 gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
131		*Berilyum	Numune tipi - Miktarı Serum (Lacivert kapaklı tüp) - 3 mL (min 2.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 6 ay Ortam - 3 gün	Berilyum maruziyeti, berilyum toksisitesi	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
132	L101620	*Beta 2-Mikroglobulin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Multiple myeloma, HIV enfeksiyonu, Hodgkin's hastalığı, non-Hodgkin's Lymphoma, glomeruler filtras- yonun değerlendirilmesi	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
133	L101630 (Spot idrar) L101630 (24 Saatlik)	*Beta2-Mikroglobulin (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saat) - 5 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Renal tubuler yetersizlik şüphesi	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
134	L107110	Beta-Hcg	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün	Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
135	L101670	Bikarbonat (HCO3)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün	Asidoz ve alkoloz durumları, tüm ciddi hastalar, hipotansiyon, dehidrasyon	Fotometrik		
136	900690	Bilirubin (İndirekt)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 6 saat	Sarılık	Fotometrik	Pazartesi,Salı,Çarşamba, Perşembe,Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
137	L101710	Bilirubin (Direkt)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 6 saat	Sarılık	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
138	L101730	Bilirubin (Total)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 1 gün	Sarılık	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
139	L101760	*Biotinidaz Aktivitesi	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 5 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün	Yeni doğanlarda biyotin eksikliği semptomlarının (epilepsi, solunum problemleri, deri döküntüleri, alo-pesi) araştırılması	EIA	Pazartesi, Çarşamba günleri çalışılıyor:	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
140		*Bizmut (Bi)	Numune tipi - Miktarı Serum (Lacivert kapaklı tüp) - 3 mL (min 2.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Mesleki maruziyet, tedavi takibi	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
141	L101320	*BNP (Brain Natriüretic Peptide)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma - 1 mL (min 0.4 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 365 gün	Konjestif kalp yetmezliği tanısında diagnostik değeri vardır.	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
142	905670	Boğaz Kültürü	Numune tipi - Miktarı Boğaz süruntüsü Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Tonsillit, üst solunum yolu enfeksiyonları	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
143	907050	*Borrelia Burgdorferi Antikor IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 2 gün	Lyme hastalığı şüphesi (erythema migrans, reaktif artrit)	IFA / EIA	Çarşamba saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
144	907060	*Borrelia Burgdorferi Antikor IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 2 gün	Lyme hastalığı şüphesi (erythema migrans, reaktif artrit)	IFA / EIA	Çarşamba saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
145	L101780	*BOS İmmunelektroforez (Oligoklonal bant)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 60 gün Ortam - 14 gün	Multiple skleroz	Elektroforez	Salı saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	14 gün sonra saat 18:00
146	905730	*BOS Kültürü	Numune tipi - Miktarı BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 1 gün	Menenjit etkeninin araştırılması	Kültür	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
147	905760	Boyalı mikroskobik inceleme	Numune tipi - Miktarı BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve Sürüntü örnekleri Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Ortam - 1 gün	Gram, metilen mavisi, Ziehl- Neelsen vb.	Mikroskobik	Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
148	905770	Boyasız Direk Mikroskobik İnceleme	Numune tipi - Miktarı Mikolojik örnekler Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Ortam - 1 gün	Mikolojik incelemeler	Mikroskobik	Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
149	L101810	*Böbrek Taşı Analizi	Numune tipi - Miktarı Analiz istenen böbrek taşları, türlü vücut salgısından ve dokusundan arındırılmış, mümkünse alkol veya su ile yıkanıp temizlendikten sonra oda sıcaklığında kurutulmuş olmalıdır. Taş; temiz, küçük bir kutu veya ağzı kilitli naylon poşete konulup analize gönderilmelidir. Sargı bezine sarılmış olarak gönderilmemelidir. Çok ince taneli böbrek veya mesane taşlarının sargı bezi dokusu içinde hapsolması veya kaybolması söz konusu olduğundan mesuliyet kabul edilmez. Ayrıca, taşlar doğrudan şeffaf bant ve benzeri yapıştırıcılar üzerine yapıştırılmamalıdır. Analizden sağlıklı sonuç alınabilmesi için taş minimum 3 mm çapında (mercimek kadar) olmalıdır. Daha küçük boyutlardaki taşlarda sağlıklı analiz ancak küçük parçalar halinde çok sayıda taşın analizi ile mümkün olmaktadır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 365 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam (tercih edilir) - 365 gün	Üriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesi	Semikantitatif (Manuel Test)	Her gün (Cumartesi saat 16:00 kadar kabulü yapılan numuneler çalışmaya dahil edilir:)	7 gün sonra saat 18:00
150	907070	Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi	Aglütinasyon	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün 18.00
151	907080	*Brucella Aglütinasyon Testi (2-Merkapto Etanol ile)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi	Aglütinasyon	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
152	907080	Brucella Aglütinasyon Testi (Coombs anti Serumu ile) (Wright)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi	Aglütinasyon	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün 18.00
153	907091	*Brucella IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi	EIA	Pazartesi saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
154	907092	*Brucella IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi	EIA	Pazartesi saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
155	905677	Burun Akıntısı Kültürü	Numune tipi - Miktarı Burun Akıntısı Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Burun enfeksiyonları	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
156	L101820	*Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Akromegali, pitüiter cücelik, hipopituitarism	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
157	L101870	*C1 Esteraz Inhibitörü	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 6 gün	Herediter anjiyoödem, SLE, otoimmün hastalıklar	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
158	L101860	*C1 Esterase Inhibitor activity (Fonksiyonel)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı plazma (min 1 mL)Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 6 gün 4 saat içerisinde laboratuvarımızda olamayacak numuneler en az -20'C'de dondurulmalı ve transferleri kuru buz ile yapılmalıdır.	Herediter anjioödem, SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklar	Nefelometrik	Pazartesi günleri çalışılır: (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün sonra saat 18:00
159	L104560	*C3 (Kompleman 3)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Glomerulonefritin tüm formlarında hastalığın gidişatının takibi, SLE	Türbidimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
160	L104570	*C4 (Kompleman 4)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	İmmün kompleks bozuklukları, anjiyo ödem, SLE	Türbidimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
161	L101900	*CA 125	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 180 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün	Epitelyal over kanserli hastaların tedavi takibi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
162	L101920	*CA 15-3	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 90 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün	Metastatik göğüs kanseri, hastalığın rekürrensini ve tedaviye cevabı değerlendirmek	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
163	L101940	*CA 19-9	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 90 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün	Gastrointestinal kanserlerin tüm formları ve Diğer: adenokarsinomalar, hastalığın gidişatının izlenmesi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
164	L101960	*CA 72-4	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 90 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün	Gastrik karsinoma (Müsinöz over CA)	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
165	907950	*c-ANCA (PR3 ANCA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 21 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün	Wegener hastalığı	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
166	906120	Candida kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Materyali Sıcaklık - Zaman Oda ısısında - 4 saat Buzdolabında - 24 saat	Candida aranması	Kültür	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	3 gün sonra saat 18:00
167	L116920	*CD34 Analizi (CD45,CD14,CD34 sonuçları ile beraber verilir)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 3 gün	Kök hücre nakli	Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
168	L116650	*CD4/CD8 Analizi (CD4, CD8, CD14,CD45 sonuçları ile beraber verilir)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 3 gün	AIDS'te tanı, takip ve tedavinin yönlendirilmesi.	Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
169	L104030	*CEA (Karsinoembriyonik Antijen)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 90 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün	Kolon, göğüs ve gastrik kanserli hastaların takibi, tedavi sonrası rekürrensin değerlendirilmesi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
170	L101980	*CH 50 Kompleman Aktivitesi	Numune tipi - Miktarı Serum (Kırmızı kapak tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Klasik yol kompleman defekti	EIA	Cuma saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
171	907110	*Chlamydia Antijeni	Numune tipi - Miktarı Servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön İdrar (erkek) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 1 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün	Ürogenital enfeksiyon	Immunokromotografik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
172	907130	*Chlamydia Pneumoniae IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün	Pnömoni, ateroskleroz riski	EIA	Pazartesi saat 11:00 (Saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
173	907140	*Chlamydia Pneumoniae IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün	Pnömoni, ateroskleroz riski	EIA	Pazartesi saat 11:00 (Saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
174	907160	*Chlamydia Trachomatis IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün	Klamidyal enfeksiyonların (trahom, pelvik inflamatu-ar hastalıklar, pnömoni, lenfogranuloma venerum) incelenmesi, Reaktif artrit	EIA	Pazartesi saat 11:00 (Saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
175	907170	*Chlamydia Trachomatis IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün	Klamidyal enfeksiyonların (trahom, pelvik inflamatu-ar hastalıklar, pnömoni, lenfogranuloma venerum) incelenmesi, Reaktif artrit	EIA	Pazartesi saat 11:00 (Saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
176	908130	*Chlamydia Trachomatis PCR	Numune tipi - Miktarı İdrar, Endoserviks veya erkek uretrasından elde edilen swab örnekleri - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Ürogenital enfeksiyon	Real time PCR	Salı Saat 12:00 (Saat 11:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya dahil edilir:)	Ertesi gün saat 18:00
177	900871	*Civa, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün	İntoksikasyon, mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
178	L102010	*Civa, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 saatlik) - 10 mL (min 2 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	İntoksikasyon, mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
179	L102000	*Civa, Tam kan	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün	İntoksikasyon, mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
180	L104730	CK (Kreatin Kinaz)	Numune tipi - Miktarı Serum - 2 mL (min 0.75 mL) Sıcaklık - Zaman 2-25 °C - 7 gün	Miyokard infarktüsü tanısı, iskelet kası hastalıkları, travmatik kas hasarı	Enzimatik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
181	L104750	*CK İZOENZİM ELEKTROFOREZİ	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 360 gün Ortam - 1 gün	CK izoenzimlerinin tespiti	Elektroforez	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	Kabul yapıldıktan 1 ay sonra sonuçlanır.
182	L104760	*CK-MB (İmmunoinhibisyon)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 8 Saat	Artmış total CK değerlerinin ayırıcı tanısı, miyokard infarktüsü	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
183	907180	*Clostridium Difficile Toksin A	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 1g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 2 Saat	Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit)	Immunokromotografik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
184	907190	*Clostridium Difficile Toksin B	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 1g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 2 Saat	Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit)	Immunokromotografik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
185	906360	*CMV IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.8 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Yeni veya önceden CMV enfeksiyonu geçirip geçirmediğini belirler	CLIA/ELISA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
186		*CMV IgG (Vidas)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.8 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Yeni veya önceden CMV enfeksiyonu geçirip geçirmediğini belirler	FIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
187	907220	*CMV IgG Avidité Testi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 7 gün	Primer CMV enfeksiyonun muhtemel başlama ve seyri hakkında bilgi verir	ELFA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
188	906370	*CMV IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.8 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Özellikle hamileler başta olmak üzere Diğer: CMV enfeksiyon risk grubunda bulunanlar veya CMV enfeksiyon bulgu ve belirtileri gösteren hastalarda akut CMV enfeksiyonlarının belirlenmesinde kullanılır.	CLIA/ELISA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
189		*CMV IgM (Vidas)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.8 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Özellikle hamileler başta olmak üzere Diğer: CMV enfeksiyon risk grubunda bulunanlar veya CMV enfeksiyon bulgu ve belirtileri gösteren hastalarda akut CMV enfeksiyonlarının belirlenmesinde kullanılır.	FIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
190	908140	*CMV PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum, BOS, İdrar, Diğer: vücut sıvıları - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	CMV enfeksiyonunun tanısı	Real Time PCR	Perşembe Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
191	908140	*CMV Viral yük PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum, BOS, İdrar, Diğer: vücut sıvıları - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	CMV enfeksiyonunun tanısı ve izlenmesi	Real Time PCR	Perşembe Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
192	L101830	*C-Peptid	Numune tipi - Miktarı Serum, İdrar - 1 mL (min 0.8 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün	İnsülinoma, tip 1 diabet, endojen insülin salınımının araştırılması	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
193	L106680	CRP (C Reaktif Protein)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.8 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 3 gün	İnflamasyon, romatizmal hastalıklar	Türbidimetrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
194	905830	*Cryptosporidium antijen	Numune tipi - Miktarı Gaita - 10 g (min 2,5 g) Not: Topladıktan sonra 1 saat içinde %10'luk formalin solüsyonun içine konur. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 30 gün	Diyare nedeninin araştırılması	Immunokromotografik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
195	L104420	*Ctx (Beta Cross)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı plazma (tercih edilir), Serum - 1 mL (min 0.4 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün	Osteoporoz için antirezorptif ilaçların tedavi etkinliğinin izlenmesi	ECLIA	Pazartesi saat12:00 (saat:13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
196	L102040	Çinko	Numune tipi - Miktarı Serum, Lacivert kapaklı tüp tercih edilir - 1 mL (min 0.2 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet, eksiklik sendromu	Kolorimetrik	Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
197	L102060	*Çinko, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Ortam - 5 gün	Mesleki maruziyet, eksiklik sendromu	AAS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
198	L102050	*Çinko, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar - 10 mL (min 5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet, eksiklik sendromu	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
199	L102070	*Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 15 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 92 gün	Yağ asidi oksidasyon defektleri	GC MS	Cumartesi saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 Hafta sonra Salı saat 18:00
200	L102090	D-Dimer	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 4 saat	Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz	İmmunotürbidimetrik	Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
201	907230	*Delta Antijeni (Hepatit D Virüs Antijeni)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 30 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Hepatit B vakalarında delta virüsle süper-enfeksiyon şüphesi	EIA	Çarşamba 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
202	907240	*Delta Antikoru (Hepatit D Virüs Antikoru)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 30 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Hepatit B vakalarında delta virüsle süper-enfeksiyon şüphesi	EIA	Çarşamba 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
203	L102120	Demir	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2 8°C - 3 hafta 15 - 25°C - 7 gün	Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
204	L102160 (Serbest Demir)	*Demir Bağlama Kapasitesi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 1 gün	Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
205	L102160 (Total Demir)	Demir Bağlama Kapasitesi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 1 gün	Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
206	L102170 (Spot idrar) L102180 (24 Saatlik idrar)	*Deoksipiridinolin	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün	Osteoporoz, Paget hastalığı	HPLC	Çarşamba saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00
207	L102190	*Desmoglein-1 abs	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 14 gün	Pemfigusta blister oluşumundan sorumlu olan desmoglein-1 (dsg-1) ve desmoglein-3'e (dsg3) karşı antikorlardır.	EIA	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	25 gün sonra sonuçlanır.
208	L102200	*Desmoglein-3 abs	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 14 gün	Pemfigusta blister oluşumundan sorumlu olan desmoglein-1 (dsg-1) ve desmoglein-3'e (dsg3) karşı antikorlardır.	EIA	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	25 gün sonra sonuçlanır.
209	L102100	*DHEA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 21 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 6 saat	Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Hirşutizm, amenore, polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesinde önemlidir. Diğer: androjenlerle (testosteron ve androstenedion) beraber yorumlanmalıdır.	ELISA	Cuma günleri saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
210	L102110	*DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 6 saat	Hirsutizm, adrenogenital sendrom şüphesi, adreno- kortikal tümör	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
211		*Diamin Oksidaz (DAO)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Histamin İntoleransı	EIA	Pazartesi saat 10:00 (Saat 09:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
212	L114090	*Digoksin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 6 saat	Tedavi takibi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
213	L102250	*Dihidrotestosteron (DHT)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün Ortam - 6 saat	Hipogonadizm, hirsutizm	LC-MS/MS	Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 Hafta sonra Salı saat 18:00
214	705210	*Direkt Coombs	Numune tipi - Miktarı Edtalı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 48 saat Ortam (tercih edilir) - 48 saat	Eritrositlerin yüzeyindeki antikorların varlığının araştırılması,Otoimmun hemolitik anemi, ilaçla in- düklenen hemolitik anemi,Hemolitik transfüzyon reaksiyonlar	Jel Santrifügasyonu	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
215	L102260	*Doku Transglutaminaz IgA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün	Celiac hastalığı	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
216	L102270	*Doku Transglutaminaz IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün	Celiac hastalığı	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
217	L104060 (Spot idrar) L104070 (24 Saatlik idrar)	*Dopamin, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Not: 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi,Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
218	L104050	*Dopamin, Plazma	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	HPLC	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
219	L102290	*Dörtlü Tarama Testi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Down sendromlu gebelik riski	CLIA	Hafta içi her gün	Üç gün sonra saat 18:00
220	907280	*EBV EA IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	EBV enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
221	907280	*EBV EA IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	EBV enfeksiyon şüphesi	EIA	Çarşamba saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
222	907290	*EBV EBNA IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	EBV enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
223	908728	*EBV PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı plazma (tercih edilir), Serum, Diğer: Vücut sıvıları 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 28 gün	EBV virüsünün belirlenmesi	Real Time PCR	Çarşamba Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
224	907310	*EBV VCA IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	EBV enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı-Cuma saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
225	907320	*EBV VCA IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	EBV enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı-Cuma saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
226	912390	*Echinococcus Granulosus IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün		IFA	15 günde bir Pazartesi günü çalışılır	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
227	905881	Eklem Sıvısı Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Materyali Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün		Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
228	907340	*ENA Tarama	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	otoimmün bağ dokusu hastalıkları, sLE	EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
229		*ENA Tarama (12'li Panel) RNP/sm, sm, ss- A, ss-B, scl-70, Jo-1) ds-DNA, sent-romer, nücleosom, ribozomal P protein, histone, PCNA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	otoimmün bağ dokusu hastalıkları, sLE	Immunblo7t	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
230		*ENA Tarama (6'lı Panel) (RNP/sm, sm, ss- A, ss-B, scl-70, Jo-1)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	otoimmün bağ dokusu hastalıkları, sLE	Immunblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
231		*ENA Tarama (17'li Panel) RNP/sm, sm, ss- A, ss-B, scl-70, Jo-1, ds-DNA, sentromer, nücleosom, ribozomal P protein, histone, PCNA, PM-Scl, Mi-2, Ku, U1-snRNP	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	otoimmün bağ dokusu hastalıkları, sLE	Immunblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
232	904460	Eozinofil (Total)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 4saat	Allerjik hastalıklar	Cell Counter + Hesaplamalı test	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
233	L102300	*Eozinofil Katyonik Protein (ECP)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) (Kanı normal kırmızı kapaklı tüplere aldıktan sonra 60 dk oda ısısında bekletin. 10 dk yaklaşık 1000 g'de santrifüj edin, Serumu temiz bir tüpe ayırın) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Atopik dermatit ve bronşiyal astım vakalarında infek-tif aktivitenin ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
234	L102310	*Eritropoetin (EPO)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Renal anemi, tedavi takibi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
235		*Eritrosit Membran Esansiyel/Metabolik Yağ Asidi Analizi	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 7 gün		GC MS	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	Kabul yapıldıktan 15 gün sonra sonuçlanır.
236		Estimated GFR (eGFR)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Erken evre böbrek hasarının araştırılmasında kullanılan testlerden biridir.	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
237	L102320	Estradiol (E2)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Över fonksiyonlarının değerlendirilmesi, ovülasyon takibi, jinekomasti, östrojen üreten tümörler. Not : Mifepriston ile tedavi edilen hastaların, tetkikten en az iki hafta önce hekiminin kontrolünde ilacı kesmesi tavsiye edilir	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
238	L102340	*Estriol (E3)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	İntrauterin fetüsün durumunun değerlendirilmesi Not: Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
239	L114140	*Everolimus	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 7 gün	Tedavi Takibi	LC-MS/MS	Salı - Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
240	L104310	*Faktör II (Protrombin)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Uzamış aPTT ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
241	L104260	*Faktör IX (Christmas)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Hemofili B	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
242	L104350	*Faktör IX İnhibitörü	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Hemofili B tedavi takibi	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
243	L104230	*Faktör V (Proakselerin)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Uzamış aPTT ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
244	L104240	*Faktör VII (Prokonvertin)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Kanamaya eğilim ve uzamış PTZ	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
245	L104250	*Faktör VIII	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması, hemofili A, von Willebrand hastalığı	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
246	L104340	*Faktör VIII İnhibitörü	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Faktör VIII inhibitörlerinin varlığını araştırmak (tedaviye bağlı veya spontan)	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
247	L104270	*Faktör X (Stuart Faktör)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Uzamış aPTT ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
248	L104280	*Faktör XI	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
249	L104290	*Faktör XII (Hageman Faktörü)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması,sürekli azalmış aktiviteli hastalarda orta dereceli artmış tromboz riski	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
250	L104300	*Faktör XIII	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Uzamış aPTT ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
251		*Fekal Kalprotektin	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 3 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	İrritabl barsak hastalığının (İBH) irritabl barsak sendromundan ayrımı ve İBH aktivitesinin takibi	İmmunokromotoğrafik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
252	L102400	*Fenilalanin	Numune tipi - Miktarı Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Fenilketonüri	LC-MS/MS	Pazartesi - Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
253		*Fenilglioksilik	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün		HPLC	Çarşamba 12:00 (12:00 den sonra gelen örnekler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00
254	L114160	*Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	İlaç tedavisinin takibi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
255	L114170	*Fenobarbital	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	İlaç tedavisinin takibi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
256	911380	*Fenol	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 180 gün	Mesleki maruziyet, toksisite semptomları	HPLC	Çarşamba(Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00
257	L102410	Ferritin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
258	L102450	*Fibrinojen	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 1 gün	dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz	Koagülometrik	Hafta içi her gün	Üç saat sonra
259	L102470	*Fitanik asit	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 15 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 92 gün	Kalıtsal metabolik hastalıkların ayırıcı tanısı, yağ asidi oksidasyon defektleri	GC MS	Çarşamba 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki hafta sonra saat 18:00
260	L102480	Folik Asit	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Anemi, folat eksikliği	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
261	L102490	*Folik Asit, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 gün	Anemi, folat eksikliği	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
262	L102510	Fosfor	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2 8°C 4 gün 15 25°C - 1 gün	Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiper-paratiroidizm	Fotometrik UV	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
263	L102530 (24 Saatlik idrar)	*Fosfor (24 Saatlik İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiper-paratiroidizm	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
264	L102520 (Spot idrar)	*Fosfor (Spot İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiper-paratiroidizm	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
265	901260	Fronkül kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Materyal Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Patojen bakterinin izolasyonu	Kültür	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
266	L102570	*Fruktozamin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 3 gün	Diabet hastalarının kısa süre (2- 3 hafta) önceki genel kan glukozunun değerlendirilmesi	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
267	L102500	FSH (Follikül Stimülan Hormon)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 1 gün	İnfertilite, menstruel siklus bozuklukları, menopoz başlangıcı	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
268	L106760	FT3 (Serbest Triiyodotironin)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün Ortam - 1 gün	T3 hipertiroidizm, tedavi takibi	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
269	L106770	FT4 (Serbest Troksin)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 3 gün	Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
270	912140	*FTA-Abs IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Treponema pallidumun neden olduğu sifilizin spesifik serolojik tanısı ve nontreponemal test sonuçlarının doğrulanması	IFA	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	15 gün sonra saat 18:00
271	912150	*FTA-Abs IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Treponema pallidumun neden olduğu sifilizin spesifik serolojik tanısı ve nontreponemal test sonuçlarının doğrulanması	IFA	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	15 gün sonra saat 18:00
272		*Gabapentin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Epilepsi tedavisinde GABA(Gama Amino Buturik Asit) molekülünün taklidi olarak kullanılan bileşiktir. Yetişkinlerde diyabetik polinöropati ve postherpetik nevraljide görülen nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı,Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18:00
273	905672	Gaita Kültürü	Numune tipi - Miktarı Gaita Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Diyare	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
274	L102630	*Gaita Steatokrit	Numune tipi - Miktarı Gaita Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Gastrointestinal kanama şüphesi, kolorektal kanserlerin erken saptanması	Mikroskobik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
275	905920	Gaitada Amip	Numune tipi - Miktarı Gaita (Numune 30 dk. İçinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.) - 5 g (min 2 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Malabsorpsiyon bozuklukları	Mikroskobik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Hafta içi her gün 3 saat sonra
276	905930	Gaitada Gizli Kan	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 2 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Paraziter hastalıklar	Immunokromotoğrafik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Hafta içi her gün 3 saat sonra
277	L102610	*Gaitada Hazım	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 2 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Malabsorpsiyon bozuklukları	Mikroskobik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
278	905870	*Gaitada Parazit	Numune tipi - Miktarı Gaita - 10 g (min 5 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılması (Laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz araştırılır)	Mikroskobik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
279	L102600	*Gaitada PH	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 2 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Malabsorpsiyon bozuklukları	Kolorimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
280	L102620	*Gaitada Sterkobilin Aranması	Numune tipi - Miktarı Gaita Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün		KALİTATİF	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
281		*Gaitada Şeker Kromotografisi	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 2 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Glukozürinin değerlendirilmesi (Laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz ve sakkaroz araştırılır)	RIA	Hafta içi her gün	7 iş günü içerisinde saat 18:00
282	907390	*Galaktomannan Antijeni	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Aspergillus enfeksiyonları	EIA	Çarşamba saat:12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
283		*Gangliosit Antikorları (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1a,GT1a, GQ 1B)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 6 ay	Çeşitli periferal nöropatilerin tanısına yardımcı olarak	Immunblot	15 günde bir Cuma saat 12:00(Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
284		*Gardnerella Vaginalis PCR	Numune tipi - Miktarı Vücut sıvıları Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Gardnerella Vaginalis belirlenmesi	Real Time PCR	Salı saat 12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
285	L102800	*Gastrin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün	Peptik ülser relapsı, zollinger- Ellison sendromu şüphesi, gastrinoma	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
286	L102780	GGT (Gama Glutamil Transferaz)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 7 gün	Karaciğer ve safra kanalı hastalıkları	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
287	907400	*Giardia Antijeni	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 2 g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Gastro-enterit, enterokolit	Immunokromotoğrafik	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
288	L102890	Glukoz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2 8°C - 7 gün 15 25°C - 2 gün	Diabetes mellitus (tarama, tedavi, check-up)	Enzimatik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
289	L102980	*Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 20 gün	Hemolitik anemi	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
290		*Glukoz Tolerans testi	Numune tipi - Miktarı Serum, Florid/oksalatlı plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Diabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı (Sabah açlık ve 75 g glukoz solüsyonu içtikten 2 saat sonra kan örneği alınır)	Fotometrik	Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe, Cum a ve Cumartesi	Dört saat sonra
291	905970	*Gonokok Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Materyali Sıcaklık - Zaman Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün	Neisseriae gonorhoea izolasyon ve identifikasyonunda	Kültür	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
292	905679	Göz (Konjonktiva) Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Materyali Sıcaklık - Zaman Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün	Göz enfeksiyonları	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
293	908020	*Gruber-Widal (Salmonella Tüp Aglütinasyonu)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün	Enterit, nedeni açıklanamayan ateş, reaktif artrit	Lateks	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
294		*Gümüş (Ag)	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. İdrar (Spot) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Mesleki maruziyet, toksisite semptomları	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
295	L103020	*Haptoglobin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hemolitik anemi, intravasküler Hemoliz:	Türbidimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
296	906510	*HAV IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 3 gün	HAV na karşı antikor düzeyinin/bağışıklığın (aşılama öncesi) belirlenmesi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
297	906530	*HAV IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 3 gün	Akut hepatit A şüphesi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
298	907420	*HBeAg	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 360 gün Ortam - 1 gün	Akut veya kronik hepatit B	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
299	907450	HBsAg	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Akut veya kronik hepatit B şüphesi veya virüs taşıyıcılığı, prenatal takip	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
300	907450	*HBsAg (Quantitative)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün	Akut veya kronik hepatit B şüphesi veya virüs taşıyıcılığı, prenatal takip	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	Aynı gün saat 18:00
301	908150	*HBV DNA PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 6 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 84 gün Ortam - 1 gün	Kronik hepatit B vakalarında tedaviye başlamadan önce, tedavi takibi	PCR	Salı ve Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
302	908711	*HCV Doğrulama	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	HCV Şüphesi	Westernblot	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	Laboratuvar kabulü yapıldıktan 30 gün sonra sonuçlanır.

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
303	908160	*HCV Genotiplendirme	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 28 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 7 gün	Hepatit C virusu enfeksiyonlarının seyri ve tedavisinin takibi	PCR	Pazartesi saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
304	908170	*HCV RNA PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 5 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Akut veya kronik hepatit C, tedavi takibi	PCR	Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
305	L103050	HDL Kolesterol	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi	Enzimatik kolorimetrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
306	908171	*HDV RNA PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün	Kronik HBV hastalarında HDV enfeksiyonlarının varlığının belirlenmesi	PCR	Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
307	907490	Helicobacter Pylori Direkt Antijen	Numune tipi - Miktarı Gaita Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 60 gün	Kronik gastrit, peptik ülser	Immunokromotoğrafik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Hafta içi her gün 3 saat sonra
308	907500	Helicobacter pylori lgA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 2 gün	Kronik gastrit, peptik ülser	EIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Hafta içi her gün 3 saat sonra
309	907510	Helicobacter pylori lgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 2 gün	Kronik gastrit, peptik ülser	EIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Hafta içi her gün 3 saat sonra
310	L102820	Hemoglobin A1C (HbA1c)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 1 gün	Diabetes mellitus (uzun süreli takip)	Türbidimetrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
311	L103150	*Hemoglobin Elektroforezi	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün	Hemoglobinopatilerin, hemolitik anemi ve talassemi-lerin ayırıcı tanısı	Kapiler Elekroforez	Pazartesi-Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
312	L107020	Hemogram (Tam Kan Sayımı)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün Ortam - 1 gün	Hematolojik bozuklukların araştırılması, infeksiyon-lar, kan kaybı	Floresan Flow Sitometri	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
313	906670	HIV 1 / HIV 2 p24 Antikoru	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 7 gün	HIV enfeksiyon şüphesi	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
314	908220	*HIV-1 RNA PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 6 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 84 gün	HIV-1 enfeksiyonlarının erken tanısında, HIV-1 pozitifliğinin teyidi, HIV-1 pozitif anneden doğan çocuğun anneden HIV-1 alıp almadığının belirlenmesinde(18 ay içinde), HIV-1 viral yük belirlenmesi ve tedavi takibinde	Real Time PCR	Cuma Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Üç gün sonra saat 18:00
315		*Hidroksipirolin (Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün	Total kollajen turnover'ını gösterir. Kemik rezorbsiyo-nu için iyi bir göstergedir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.	LC-MS/MS	Çarşamba, Cuma saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki iş günü sonra saat 18:00
316	L106680	*High Sensitive CRP	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi	Türbimetrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
317	911300	*Hippürik asit, P-metil, M-metil, O-metil hippürik asit	Numune tipi - Miktarı İdrar - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 5 gün	Toluen ve ksilen maruziyetinin araştırılması	HPLC	Çarşamba saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Cuma günü saat 18:00
318	L103190	*HLA B27	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Spondilartritler	Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
319		*HLA B7	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam (tercih edilir) - 4 gün	Ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit ve Reiter Sendromu tanılarında yardımcıdır.	Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
320		HOMA1-IR (İnsülin rezistansı)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) (Şehir dışından numune gönderimi yapılırken gri kapak (oksalatlı tüp) ve Serum numunesi beraber gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 6 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 84 gün	HOMA-IR indeksi, insülin direncinin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülin direnci normal konsantrasyondaki insülinin normalden daha az biyolojik yanıt oluşturması ya da glukoz kullanımını uyarma etkisinin azalmasıdır. İnsülin normalde karaciğerde glukoneogenezi ve glikojenolizi inhibe ederek hepatik glukoz üretimini baskılar. Ayrıca glukozu kas ve yağ dokusu gibi periferik dokulara taşıyarak burada ya glikojen olarak depolanmasını ya da enerji üretmek üzere okside olmasını sağlar. İnsülin direncinde insülinin karaciğer, kas ve yağ dokusundaki bu etkilerine karşı direnç oluşarak hepatik glukoz supresyonu bozulur. Kas ve yağ dokusunda insülin aracılığı ile oluşan glukoz kullanımı azalır. İnsülin direncini karşılamak ve normal biyolojik yanıt sağlamak için beta hücreleri sürekli olarak insülin salgısını arttırmaya yönelik çalışır. Sonuçta normoglisemi sağlanırken insülin düzeylerinde de normale göre yüksek bir seviye oluşur. Bu hiperinsülinemik süreçte beta hücresinde başlangıçta herhangi bir bozukluk yoktur. Fakat beta hücre fonksiyon kaybı başladığında insülin salgısı da giderek azalmakta ve ortaya diyabet çıkmaktadır. Birçok kalıtsal ve edinilmiş faktörler insülin duyarlılığını etkileyebilmektedir. Bunlardan bazıları örneğin cinsiyet kaçınılmazdır. Bölgesel adipozite, iskelet kas kitlesi ve fizik kondisyon durumu ile bağıntılı bazı faktörler potansiyel olarak modifiye edilebilecek özelliklerdir.	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
321		*HOMA-%B	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) (Şehir dışından numune gönderimi yapılırken gri kapak (oksalatlı tüp) ve Serum numunesi beraber gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 6 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 84 gün	Pankreas beta hücre fonksiyonunun değerlendirilmesi için kullanılan HOMA hesaplama modelidir. HOMA1 IR testi ile birlikte istenmelidir. Tek başına kullanılmaz.	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
322	L109960	*Homosistein	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 6 ay	Dejeneratif vasküler hastalıklar, kardiyavasküler riskin değerlendirilmesi, tromboz riskinin belirlenmesi	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
323	L104100 (Spot idrar) L104110 (24 Saatlik idrar)	*Homovanilik asit (HVA)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 3 mL) 24 saatlik İdrar (Asetik asit veya 6N HCl üzerine İdrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 180 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
324	908200	*HSV PCR (HSV Tip1 VE HSV Tip 2)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma,Serum, BOS, BAL, Sürüntü örnekleri - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	HSV virüsünün belirlenmesi	Real time PCR	Çarşamba Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
325	907520	*HSV Tip 1 IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
326	907530	*HSV Tip 1 IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
327	907560	*HSV Tip 2 IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
328	907570	*HSV Tip 2 IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi	EIA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
329	908230	*Human Papilloma Virus (HPV) PCR Risk Grubu Taraması ve Tiplendirme	Numune tipi - Miktarı Servikal Smear (ThinPrep. Sure Path, v.b), biyopsi örneği Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 42 gün Ortam - 42 gün	Servikal kanserler, servikal displazi, servikal kondiloma (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 olmak üzere 14 adet HPV (Yüksek risk) tiplendirmesi yapılır)	PCR	Cuma (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Çarşamba saat 18:00
330	907620	*IgA	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hiper ve hipogamaglobulinemi, antikor yetersizlik sendromu, gammopati	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
331	L103530	*IgD	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 7 gün	IgD düzeyinin belirlenmesinde	Türbidimetrik	Salı günleri saat 16:00 (Saat 17:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
332	L103540	*IgE	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün Ortam - 2 gün	Allerjik hastalıklar, tedavi takibi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
333	907630	*IgG	Numune tipi - Miktarı Serum, BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hiper ve hipogamaglobulinemi, antikor yetersizlik sendromu, gammopati	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
334	907790	*IgG 1	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hümoral ve hücresel immün yetmezlikler,tekrarlayan enfeksiyonlar.	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
335	907790	*IgG 2	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hümoral ve hücresel immün yetmezlikler,tekrarlayan enfeksiyonlar.	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
336	907790	*IgG 3	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hümoral ve hücresel immün yetmezlikler,tekrarlayan enfeksiyonlar.	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
337	907790	*IgG 4	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hümoral ve hücresel immün yetmezlikler,tekrarlayan enfeksiyonlar.	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
338	907790	*IgG alt sınıfları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hümoral ve hücresel immün yetmezlikler,tekrarlayan enfeksiyonlar.	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
339	L103550	*IgG Indeksi	Numune tipi - Miktarı Serum ve BOS birlikte gönderilmesi gerekir - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Demiyelinizan hastalıklar	Nefelometrik, fotometrik	Salı saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	14 gün sonra saat 18:00
340	907640	*IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Hiper ve hipogamaglobulinemi, antikor yetersizlik sendromu, gammopati	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
341	908030	*Interleukin 6	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	İmmün infeksiyöz veya inflamatuar bozuklukların fizyopatolojisinin araştırılması	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
342		*Intrinsik Faktör Antikoru (IF)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün		EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
343	905671	İdrar Kültürü	Miktar İdeal (En az) : 5 mL (2 mL) Transport / Saklama Koşulları : 2-8°C	Üreme olursa identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testi çalışılır.	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
344	905671	*İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Ortam - 2 saat	İdrar yolu enfeksiyonu	Kültür	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
345	L107010	İdrar Tahlili	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Ortam - 2 saat	Böbrek ve İdrar yolu hastalıkları	Strip + Mikroskobik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
346		*İdrar Total Glukozaminoglikan (GAG)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 15 gün Dondurulmuş - 365 gün	Mukopolisakkaridoz taraması	Fotometrik	Perşembe saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Salı günü saat 18:00
347	L103620	*İkili Tarama Testi (Birinci Trimester, Down sendromu (PAPP-A + serbest beta HCG))	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Down sendromlu gebelik riski (PAPP-A ve free beta-hCG ölçümü ve NT [nuchal translucency] dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.)	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
348	L103740	*İmmünelektroforezi (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 5 gün Ortam - 3 gün	Paraproteinüri veya Bence Jones proteinüriyi saptamak veya ekarte etmek	Jel Elektroforez	Pazartesi - Perşembe saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	ertesi gün saat 18:00
349	L103720	*İmmünelektroforezi (Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Plazmasitoma şüphesi, elektroforezde paraprotein	Jel Elektroforez - Kapiler Elektroforez	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	ertesi gün saat 18:00
350	705290	İndirekt Coombs	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 3 gün	Eritrositlere karşı oluşan antikorların araştırılması	Jel Santrifügasyonu	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	ertesi gün saat 18:00
351	L103760	*İnhibin A	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Preeklampsi, Down sendromu, bazı kanserler	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	ertesi gün saat 18:00
352	L103760 (Açlık) L103770 (Tokluk)	İnsülin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün	Hipoglisemi, insülinoma	ECLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
353	L103810	*İnsülin Like Growth Faktör Bağlayan Protein 3 (IGF BP3)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Büyüme hormonu yetersizliği, beslenme durumunun değerlendirilmesi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
354		*İnsülin rezistansı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün	Metabolik sendrom tanısı	CMIA ve fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
355	L103820	İyonize Kalsiyum (Ca+2)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün	Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları	ISE	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
356	L103840 (24 Saatlik idrar) L103840 (Spot idrar)	*İyot	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Spot idrar, 24 Saatlik idrar - 5 mL (min 2 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Not :Hekim tarafından başka türlü tarif yapılmamışsa, test için önerilen, iyot tedavisini kestikten sonra en az 96 saat geçmesidir. Gadolinium veya iyot içeren kontrast madde uygulamasından sonra 96 saat geçmeden test için numune verilmemelidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 21 gün	İyot eksikliği	ICP-MS	Hafta içi her gün çalışılır:	İki gün sonra saat 18:00
357	907690	*Kabakulak (Mumps) IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Geçirilmiş kabakulak şüphesi	EIA	Perşembe (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
358	907700	*Kabakulak (Mumps) IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Aktif kabakulak şüphesi	EIA	Perşembe (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
359		*Kadmiyum	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
360		*Kadmiyum, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
361		*Kalay	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 3 gün	Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün 12:00 (saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
362	L103850	*Kalsitonin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün Ortam - 4 saat	Tiroid medüller karsinoma, paraneoplastik hiperkal-semi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
363	L103890	Kalsiyum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2-8 °C - 3 hafta 15 25°C - 7 gün	Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
364	L103880 (24 Saatlik idrar) L103870 (Spot idrar)	*Kalsiyum (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 3 gün	Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
365	705140	Kan Grubu	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 3 gün	Kan grupları ve Rh tiplendirimesi	Jel Santrifügasyonu	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 1 saat sonra
366	906020	*Kan Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kan (Örnek kan kültür şişelerine alınır) - 5-10 mL Sıcaklık - Zaman Ortam - 1 gün	Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu	Kültür	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre yedi gün içerisinde saat 18:00
367	L107420	Kan Üre Azotu (BUN)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 365 gün	Böbrek yetmezliği	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
368	L102350	*Kanda Alkol (Etanol)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Numune ile birlikte kanda alkol testi formunun gönderilmesi gereklidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 1 gün	Şüpheli alkol kullanımı	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
369	L103950 (Spot idrar) L103950 (24 Saatlik idrar)	*Kappa Hafif Zincir (Total,İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
370	L103940	*Kappa Hafif Zincir (Total,Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 3 gün	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
371	L103950 (Spot idrar) L103950 (24 Saatlik idrar)	*Kappa Hafif Zincir (Serbest,İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
372	L103930	*Kappa Hafif Zincir (Serbest,Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 3 gün	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
373	L114260	*Karbamezapin	Numune tipi - Miktarı Serum (Kırmızı kapak tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 2 gün	Tedavi takibi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
374	L104010	*Karnitin/Açilkarnitin Analizi (Tandem MS)	Numune tipi - Miktarı Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Yağ asidi oksidasyon defektleri	LC-MS/MS	Pazartesi-Cuma (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
375	906041	Kateter Ucu Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kateter Ucu Sıcaklık - Zaman 2-8°C	Semikantitatif kateter ucu kültürü, intravasküler kateter kateterine bağlı kan dolaşımı enfeksiyonunun teşhisinde faydalıdır.	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
376	907710	*Kızamık (Rubeola) IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kızamık şüphesi ve bağışıklığın araştırılması	EIA	Perşembe 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
377	907720	*Kızamık (Rubeola) IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kızamık şüphesi	EIA	Perşembe 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
378	907730	*Kist Hidatik (Indirekt Hemaglutinasyon)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün	Echinococus Granülosis enfeksiyon şüphesi	IHA	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
379		*Klinik Örnekte MRSA (Staphylococcus aureus) aranması	Numune tipi - Miktarı Klinik Örnek Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının tespiti amacıyla kullanılır.	Mikroskobik	Hafta içi her gün saat 12:00 (saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre on gün içerisinde saat 18:00
380	L104210 (BOS)	*Klor	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Elektrolit metabolizması bozuklukları	ISE	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
381	L104180 (Serum)	Klor	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Elektrolit metabolizması bozuklukları	ISE	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
382	L104190 (Spot idrar)	*Klor (İdrar)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Elektrolit metabolizması bozuklukları	ISE	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
383	L104200 (24 Saatlik idrar)	*Klor (24 Saatlik İdrar)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Elektrolit metabolizması bozuklukları	ISE	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
384		*Kobalt (Co)	Numune tipi - Miktarı Serum (Lacivert kapaklı tüp) - 3 mL (min 2.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Heparinli Tam Kan/EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) İdrar (Spot) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
385		*Koenzim Q10, Serum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Numune gönderimi dondurularak yapılmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 hafta Dondurulmuş(tercih edilir) - 30 gün	Bu çalışma, göz enfeksiyonlarına neden olan fungal ve bakteriyel etkenlerin tespiti ve identifikasyonu amacıyla yapılır.	LC-MS/MS	Çarşamba (12:00' den sonra kabul edilen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Cuma Saat 18:00
386	L104520	Kolesterol	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2 8°C - 5 ila 7 gün	Primer ve sekonder lipid metabolizması bozuklukları, ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi	Enzimatik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
387	905679	Konjiktiva Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Metaryeli Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün		Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
388	L104670	*Kortizol	Numune tipi - Miktarı Serum (Kırmızı kapak tesrcih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Hiper/hipokortizolizm	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
389	L104700 (Spot idrar) L106750 (24 Saatlik idrar)	*Kortizol, İdrar	Numune tipi - Miktarı Spot İdrar - 2 mL (min 1 mL) 24 Saatlik İdrar - 2 mL (min 1 mL) (Borik Asit ile beraber gönderilmesi tavsiye edilir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Hiper/hipokortizolizm	LC-MS/MS	Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Cuma günü saat 18:00
390	L104720 (Akşam) L104680 (Sabah)	*Kortizol, Tükürük	Numune tipi - Miktarı Tükrük - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 60 gün Ortam - 7 gün	Adrenal fonksiyonun araştırılması	LC-MS/MS	Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Cuma günü saat 18:00
391	L104780	Kreatinin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2-25 ˚C - 7 gün	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibi	Enzimatik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
392	L104820	*Kreatinin Klerens Testi	Numune tipi - Miktarı 24 Saatlik İdrar - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 90 gün Dondurulmuş - 90 gün Ortam - 14 gün	Kreatinin klirensinin hesaplanması Hesap yapılabilmesi için serum Kreatinin değeri gereklidir.	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
393	L104830	*Kriyofibrinojen	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı plazma - 5 mL (min 3 mL) Not: (Kan alımı muhakkak laboratuvarda yapılır. Dış merkezden gelen numune ile cuma günü ve hafta sonu numune kabul edilmez.)	Dolaşımdaki soğuk insolubl komplekslerin varlığının araştırılması	Presipitasyon	Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe	4 iş günü içerisinde saat 18:00
394	L104840	*Kriyoglobulin	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı plazma - 5 mL (min 3 mL) Not: (Kan alımı muhakkak laboratuvarda yapılır. Dış merkezden gelen numune ile cuma günü ve hafta sonu numune kabul edilmez.)	Bazı plazma hücre ve lenfoproliteratif hastalıklar, kollajen vasküler hastalıklar.	Presipitasyon	Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe	4 iş günü içerisinde saat 18:00
395	L104850	*Krom	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 30 gün	Mesleki maruziyet, toksisite semptomları	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
396	L104850	*Krom, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 30 gün	Mesleki maruziyet, toksisite semptomları	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
397		*Kromogranin A	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün	Endokrin tümör şüphesinde. (nöroblastoma, karsino-id, feokrostoma, küçük hücreli akciğer karsinomu)	EIA	Çarşamba saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18.00
398	905673	Kulak Akıntı Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kulak Akıntısı Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Kulak enfeksiyonları	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
399	L104870	*Kurşun	Numune tipi - Miktarı Tavsiye edilen birincil numune türü Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) (Alternatif olarak EDTA'lı Tam Kan kabul edilebilir) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Kulak enfeksiyonları	AAS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
400	902231	*Kurşun, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Tavsiye edilen birincil numune türü Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) (Alternatif olarak EDTA'lı Tam Kan kabul edilebilir) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet, toksisite semptomları	AAS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
401	L104880	*Kurşun, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet, toksisite semptomları	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
402	L104890	*Laktat (Laktik Asit)	Numune tipi - Miktarı Oxalatlı plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Numune sodyum fluorid / potasyum oksalatlı gri kapalı tüpe alındıktan hemen sonra plazma hemoliz: edilmeden hemen ayrılmalıdır. Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün	Metabolik asidoz, doku hipoksisi, ekzersiz dozunun değerlendirilmesi (aerob metabolizma: 2 mmol/L altı; anaerob metabolizma: 6 mmol/L üstü)	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 16:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
403	L104920	Laktat Dehidrogenaz (LDH)	Numune tipi - Miktarı Serum, BOS, Mayi - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam (tercih edilir) - 7 gün	Miyokard infarktüsü, pulmoner embolizm, Hemoliz	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
404		*Laktoz Tolerans Testi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam (tercih edilir) - 7 gün	Laktoz intoleransının araştırılması	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
405	L104990	*Lambda Hafif Zincir (Total,İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
406	L104980	*Lambda Hafif Zincir (Total,Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 3 gün	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
407	L104990	*Lambda Hafif Zincir (Serbest,İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
408	L104970	*Lambda Hafif Zincir (Serbest,Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 21 gün Ortam - 3 gün	Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
409	L114340	*Lamotrigine	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Tedavi takibi	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
410	L105000	LDL Kolesterol	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Dondurulmuş - 30 gün	Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi, tedavi endi- kasyonu ve takibi	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
411	907750	*Legionella Antijeni (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 24 saat	Lejyonella enfeksiyonunun tanısında	EIA	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
412	907770	*Legionella Pneumophila 1 IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Dondurulmuş - 30 gün	Lejyonella enfeksiyonunun tanısında	EIA	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
413	907780	*Legionella Pneumophila 1 IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Dondurulmuş - 30 gün	Lejyonella enfeksiyonunun tanısında	EIA	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
414		*Lenfoma (Lösemi) İmmünofenotip Analizi (21 adet monoklonal antikor sonucu verilir)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 3 gün	Lenfoma (Kullanılan monoklonal antikorların kapsamı EK'de verilmiştir) (905.080 x 21 kodundan fatura edilir)	Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
415	L114840	*Lenfosit Alt Grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 3 gün	İmmün yetmezlikler (Kullanılan monoklonal antikorların kapsamı EK'de verilmiştir) (905.080 x 8 kodundan fatura edilir)	Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
416	L114360	*Levetracetam	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Tedavi takibi	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
417		*LDL alt grupları (Lipoprint)	Numune tipi - Miktarı Serum veya EDTA plasma - 1 mL (min 0.5 mL) - Sadece açlık (12 saat) örnekleri kullanılmalıdır. - Antikoagülan olarak Heparin kullanılmamalıdır. - Örneklerin dondurulması tavsiye edilmez. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün		Jel elektroforezi	Laboratuvara danışınız	Laboratuvara danışınız
418	L105220	LH (Luteinizan Hormon)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 1 gün	Över ve testiküler yetmezlik, menopoz başlangıcı	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
419	L105100	Lipaz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 90 gün	Akut pankreatit, akut epigastrik bölge sendromu		Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
420	L105140	*Lipoprotein a	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi	Türbidimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
421		*Lipoprotein associated Phospholipase A2 (Lp-PLA2)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Lp-PLA2 aktivitesi, kalp damar hastalıkları risk taramasında kullanılır. Lipoprotein bağlı fosfolipaz A2 (Lp-PLA2) enzimi inflamasyona ve sonrasında darlığa neden olan aterosklerotik plaklarda yapılır ve kan dolaşımına salınır. PLAC test bu salınan Lp-PLA2 enziminin aktivitesini ölçen bir testtir. Enzim aktivitesi yüksek olan kişilerde kalp damar hastalığı riskinin yüksek olduğu gösterilmiştir, düşük bulunması ise riskin düşük olduğunu gösterir.	Türbidimetrik	Salı (Saat 12:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
422	L105130	*Lipoprotein Elektroforezi (Lipid Elektroforezi)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 60 gün	Dislipidemilerin ayırıcı tanısı	Elektroforez	Laboratuvara danışınız	Laboratuvara danışınız
423	L114390	*Lityum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Tedavi takibi	Fotometrik	Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe, Cum a ve Cumartesi	Dört saat sonra
424	907810	*Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM antikorları)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Tip II Otoimmün hepatit	IFA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00 (Cuma çalışılan örnekler için Pazartesi saat 18:00)
425		*Liver Profil (SLA, M2, LKM1, LC1)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün		IFA	Perşembe saat 10:00 (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma gün saat 18:00
426	L105210	*Lupus Antikoagülan (Doğrulama)	Numune tipi - Miktarı Sitrat'lı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Sitratlı tüpe kan alındıktan sonra santrifüj edilmeli ve plazma kısmı ayırılıp dondurulmalıdır. Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Antifosfolipid sendrom, SLE, tekrarlayan abortusların ve tromboz riskinin araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
427	L105200	*Lupus Antikoagülan (Tarama)	Numune tipi - Miktarı Sitrat'lı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Sitratlı tüpe kan alındıktan sonra santrifüj edilmeli ve plazma kısmı ayırılıp dondurulmalıdır. Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Antifosfolipid sendrom, SLE, tekrarlayan abortusların ve tromboz riskinin araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
428	L105230 (Serum)	Magnezyum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 365 gün	Magnezyum eksikliği, diüretik tedavisi, karaciğer bozuklukları	Fotometrik	Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
429	L105240 (BOS)	*Magnezyum	Numune tipi - Miktarı BOS, İdrar(Spot, 24 Saatlik) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 365 gün	Magnezyum eksikliği, diüretik tedavisi, karaciğer bozuklukları	Fotometrik	Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
430	L105250	*Magnezyum, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün	Magnezyum eksikliği, diüretik tedavisi, karaciğer bozuklukları	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
431	L106260	*Makroprolaktin taraması	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün Ortam - 1 gün	Yalancı prolaktin yüksekliğini araştırmada	PEG Çöktürme + CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
432		*Malaria (Sıtma) Pf/PAN Ag	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 7 gün		Immunokromotografik	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
433		*Mandelik asit	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün		HPLC	Çarşamba 12:00 (12:00 den sonra gelen örnekler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00
434		*Mangan (Ma)	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Heparinli Tam Kan/EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Eksiklik, intoksikasyon, Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
435		*Mangan (Ma), Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan/EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Eksiklik, intoksikasyon, Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
436	906120	Mantar Aranması ve Kültür	Numune tipi - Miktarı Saç, tırnak, cilt örnekleri Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Mantar enfeksiyonları	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre 30 gün içerisinde saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
437	L105260	*Melatonin, Serum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 2 Hafta Buzdolabında (tercih edilir) - 1 ay Dondurulmuş - 1 yıl		LC-MS/MS	Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Cuma günü saat 18:00
438	905671	Meni (Semen, Sperm, Ejakulat) kültürü	Numune tipi - Miktarı Meni (semen, sperm, ejakulat) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Semende enfeksiyon etkenlerinin araştırılması	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
439	L104110 (24 Saatlik idrar) L104100 (Spot idrar)	*Metanefrin, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Not: 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi,Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
440	L104090	*Metanefrin, Plazma	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
441		*Methanol (Metil alkol)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 1 gün	Metil alkol aranmaı	GC MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
442	911310	*Methemoglobin	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün	Methemoglabinemi	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
443	L114410	*Methotrexate	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Tedavi takibi	Tandem -CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
444	L105300 (Spot idrar) L105290 (Serum)	*Metil malonik asit	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Vitamin B12 eksikliğinin araştırılması	LC-MS/MS	Çarşamba 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
445	906160	*Mikobakteri Kültürü	Numune tipi - Miktarı Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında 10-15 ml Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 2 gün	Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında	Löwenstein-Jensen	Her gün (saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir gün sonraki çalışmaya kalır:)	Üreme yoksa 56 gün
446	906170	*Mikobakteri Kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)	Numune tipi - Miktarı Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında 10-15 ml Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 2 gün	Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında	Kolorimetrik	Her gün (saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir gün sonraki çalışmaya kalır:)	Üreme yoksa 42 gün

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
447	908290	*Mikobakteri Tuberculosis PCR	Numune tipi - Miktarı Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve Diğer: vücut sıvıları - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında	Real Time PCR	Çarşamba saat 12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
448	906160	*Mikoplazma Hominis Kültürü	Numune tipi - Miktarı servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön İdrar (erkek) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Mikoplazma hominis bakterisinin izolasyonu	Kültür	Hafta içi hergün (saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
449	907860	*Mikoplazma Pneumoniae IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Atipik pnömoni	EIA	Pazartesi saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	ertesi gün saat 18:00
450	907870	*Mikoplazma Pneumoniae IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Atipik pnömoni	EIA	Pazartesi saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	ertesi gün saat 18:00
451	902540	*Mikroalbumin	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 7 gün	Diabetik ve hipertansif nefropatinin erken saptanması, glomerüler proteinürinin erken saptanması, yüksek riskli gebelik takibi	Türbidimetrik	Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
452	L105330	*Miyoglobin	Numune tipi - Miktarı Serum, İdrar - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kas nekrozu (miyokard infarktüsü, şok, kas travması)	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
453		*Molibden (Mo)	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün saat 12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Üç gün sonra saat 18:00
454		*Molibden (Mo), Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün saat 12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Üç gün sonra saat 18:00
455	907830	*Mono test (Heterofil Antikor)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	İnfeksiyöz mononükleoz	Aglütinasyon	Hafta içi her gün (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
456		*Monoclonal Antikorlar (CD Markerları) Not: CD marker listesi ektedir.	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Ortam - 3 gün		Flow cytometri	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
457	L102860	*Mukopolisakkarit Tayini	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 15 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün	Mukopolisakkaridozlar	EIA	Perşembe (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Salı günü saat 18:00
458	908320	*Mycoplasma Genitalium PCR	Numune tipi - Miktarı Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve Diğer: vücut sıvıları Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Mycoplasma Genitalium belirlenmesi	Real Time PCR	Salı saat 12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
459		*Nazal Smear	Numune tipi - Miktarı Sürüntü Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Ortam (tercih edilir) - 1 gün	Allerjik ve paraziter hastalıklarında	Mikroskobik	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
460		*Neisseria Gonorrhoeae PCR	Numune tipi - Miktarı Vücut sıvıları Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Neisseria Gonorrhoeae belirlenmesi	Real Time PCR	Salı saat 12:00 (saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
461	L105430 (Serum) L105450 (Spot idrar) L105460 (24 Saatlik idrar)	*Nikel	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Mesleki maruziyet, toksisite semptomları	ICP-MS	Hafta içi her gün saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Üç gün sonra saat 18:00
462	L105510	*Nitroprussitad	Numune tipi - Miktarı İdrar - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 70 gün	Aminoasit metabolizma bozuklukları	EIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
463	L104060 (Spot idrar) L104070 (24 Saatlik idrar)	*Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Not: 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi,Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
464	L104050	*Noradrenalin (Norepinefrin), Plazma	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saat	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
465	L104100 (Spot idrar) L104110 (24 Saatlik idrar)	*Normetanefrin, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Not: 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi,Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
466	L104090	*Normetanefrin, Plazma	Numune tipi - Miktarı EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 8 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 2 saa	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi,Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Bir hafta sonra saat 18:00
467	L105530	*Nöron spesifik enolaz (NSE)	Numune tipi - Miktarı Serum (Plazma kabul edilmemektedir) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Kanı 1 saat içerisinde santrifüjleyin. Eritrositler ve trombositlerdeki NSE hemolize veya doğru şekilde santrifüjlenmemiş (ör. santrifüjden önce uzun bekleme süresi) numunelerde sonuçların yükselmesine yol açar. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Dondurulmuş - 3 ay Ortam - 6 saat Not: -20°C için belirtilen stabilite sadece aşağıdaki koşullar altında geçerlidir: Maks. 1 mL numune hacminin -70°C'nin altında sıcaklıklarda derin dondurulup, ardından -20°C'de saklanması. Diğer dondurma prosedürleri kullanıldığında numuneler düşük değerler verme eğiliminde olur.	Nöroendokrin tümörlerin ve apudomaların tedavi ve takibi için tümör markırı (küçük hücreli bronş kanseri)	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
468	L105560	*Nükleer Matriks Protein (NMP 22)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 3 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Oda Isısında - 7 gün	Mesane tümör markırı	Strip	Hafta içi her gün saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
469		*o- Krizol	Numune tipi - Miktarı İdrar - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 5 gün		HPLC	Çarşamba saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Cuma günü saat 18:00
470		OGTT 30-60-120-180 dk.	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Diabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
471	L105580 (24 Saatlik) L105570 (Spot idrar)	*Oksalat	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 3 mL) Not: 24 Saatlik İdrarı 30 mL 6 N HCl üzerine toplayın. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Nefrolitiazis	Fotometrik	Pazartesi saat 12:00 (saat:13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
472		*Omega 3 index, Eritrosit	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 2 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün		GC MS	Hafta içi her gün numune kabulü yapılır:	Kabul yapıldıktan 15 gün sonra sonuçlanır.
473	L105620	*Oraklaşma testi	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün	Orak hücreli anemi tanısında	Mikroskobik	Pazartesi - Perşembe saat 12:00 (saat:13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
474	L105660	*Organik Asit Analizi (İdrarda))	Numune tipi - Miktarı İdrar - 10 mL (min 05 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 416 gün	Yeni doğanlarda organik asit, karbonhidrat ve amino asitlerin metabolik bozukluklarının araştırılması (Laktik asit, piruvik asit, Beta OH-bütirik asit, metilmalo-nik asit, asetoasetik asit, homosistin, laktat/piruvat	GC MS	Pazartesi,Cuma (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi gün sonra saat 18:00
475		Ortam Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Materyali Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün		Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
476	L105720	*Osteokalsin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Kemik tümörleri, osteoporoz, primer hiperparatiroidizm, hipoparatiroidizm	ECLIA	Pazartesi saat12:00 (saat:13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
477	L114500	*Oxcarbazepin ve aktif metabolitleri (Trileptal)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Tedavi takibi	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün saat 18:00
478	L105740	*Ozmalarite (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Diabetes insipidus, renal fonksiyon bozuklukları	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
479	L105730	*Ozmalarite (Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 1 gün	Dehidrasyon, hiperozmolar koma, diabetes insipidus	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
480	L105750	*Ozmatik Frajilite	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün	Herediter sferositoz	EIA	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün saat 18:00
481	L106250	*P1NP	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 5 saat Dondurulmuş - 60 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	ECLIA	Pazartesi saat12:00 (saat:13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
482	907840	*p-ANCA (Anti-MPO)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Mikroskopik polianjitis, Churg Strauss sendromu	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
483	L105910	*Pankreatik amilaz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 365 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 7 gün	Akut pankreatit	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
484		*Paraneoplastik Panel	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Akciğer, meme, timus ve over karsinomları ile ilişkili otoimmun paraneoplastik hastalıklarda	Immunblot	Perşembe saat 10:00 (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma gün saat 18:00
485		*Paraoksonaz (PON)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün		Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
486	907900	*Parvovirus B19 IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Eritema infeksiyozum, gebelik esnasında şüpheli ekzantemler	EIA	Salı saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
487	907910	*Parvovirus B19 IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Eritema infeksiyozum, gebelik esnasında şüpheli ekzantemler	EIA	Salı saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
488	908330	*Parvovirus PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Parvovirus enfeksiyonlarının teyidi	PCR	Salı saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
489	906222	Periton sıvısı kültürü			Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
490	L106000	Periferik Yayma İncelemesi	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan ve periferik yayma preperatı Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir)	Hücresel veya şekilli kan elemanlarının mikroskobik incelemesi	Cell counter- Mikroskobik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
491	L100280	Pıhtılaşma Zamanı	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Numune vermek için hasta laboratuvara gelmelidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Dondurulmuş - 7 gün	Pıhtılaşma zamanı kanın pıhtılaşma sürecine ait genel bir fikir verir. Aşırı yada yetersiz pıhtılaşmanın saptanmasını sağlar. Bu testin yerine aPTT testinin yapılması önerilir.	Koagülometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
492	L106020	*Piridinolin	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün	Osteoporoz, Paget hastalığı	HPLC	Çarşamba saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00
493	L106040	Piruvat	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan, BOS - 1 mL (min 0.5 mL) Not : Kan alındıktan hemen sonra 1 mL Tam Kan, 2 mL %8 perklorik asit içeren tüpe konur, karıştırılır ve soğutmalı santrifüjde 10 dk 1500 g'de santrifüj edilir. Süpernatan	Doku hipoksisi (erken saptama), metabolik asidoz	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
494	L106070	*Piruvat kinaz	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 20 gün	Konjenital nonsferositik hemolitik anemi	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
495	907920	*Plasmodium Aranması	Numune tipi - Miktarı Kalın ve ince yayma preparatları Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 365 gün Ortam - 365 gün	Malarya enfeksiyonları	Kalın damla - Periferikyayma	Hafta içi her gün (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
496	L106080	*Plazminojen	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Trombo embolik olguların ve trombolinin değerlendirilmesi	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
497	906223	Plevra sıvısı kültürü			Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
498	908728	*Polyoma BKV virus PCR	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	BK virus enfeksiyonunun tanısı	PCR	Perşembe (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
499	908728	*Polyoma BKV virus PCR (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	BK virus enfeksiyonunun tanısı	PCR	Perşembe (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
500	1508 (L106100) 970 (L106090)	*Porfirin (Üroporfirin, heptakarboksiporfirin, hekzakarboksiporfirin, pentakarboksiporfirin, koproporfirin koproporfirin)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Not: Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik numune gönderimi yaparken; toplama başlangıcında koruyucu olarak 5 g sodyum karbonat (T272) ekleyin. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Porfiria, kurşun zehirlenmesi	HPLC	Çarşamba saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00
501	L106120 (Spot idrar) L106140 (24 Saatlik idrar)	*Porfobilinojen	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Not: Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün	Porfiria, kurşun zehirlenmesi	EIA	Çarşamba saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00
502	L106150 (Serum)	Potasyum	Numune tipi - Miktarı İdrar(Spot, 24 Saatlik), Mayi - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün	Aritmi, diüretik tedavisi, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, laksatif kullanımı		Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
503	L106180 (24 Saatlik idrar) L106190 (Vücut sıvısı)	Potasyum	Numune tipi - Miktarı İdrar(Spot, 24 Saatlik), Mayi - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün	Aritmi, diüretik tedavisi, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, laksatif kullanımı	ISE	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
504	L106190 (BOS) L106170 (Spot idrar) L106190 (Plevral sıvı)	*Potasyum	Numune tipi - Miktarı İdrar(Spot), BOS- 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün	Aritmi, diüretik tedavisi, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, laksatif kullanımı	ISE	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
505	L106200	*Prealbumin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Katabolik vakalarda beslenme durumunun takibi	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
506	L114550	*Primidone	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Tedavi takibi	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
507	L106210	*Pristanik asit	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 15 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 92 gün	Kalıtsal metabolik hastalıkların ayırıcı tanısı, Zellweger sendromu	Spektrometre	Çarşamba saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki hafta sonra saat 18:00
508	L106220	*Pro-BNP (Pro-Brain Natriuretic Peptide)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün	Kalp yetmezliği	FAI	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
509	L106230	Progesteron	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 3 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün Ortam - 8 saat	Primer over yetmezliği, sterilite tanısı, siklus bozuklukları, primer ve sekonder hipogonadizm	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
510	L106240	*Prokalsitonin	Numune tipi - Miktarı Serum, Kırmızı kapaklı tüp tercih edilir - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Sepsi		Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
511	L106260	Prolaktin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün Ortam - 1 gün	Kadınlarda: sterilite, amenore, korpus luteum yetmezliği, maskulinizasyon, galaktore Erkeklerde: erektil disfonksiyon, hipgonadizm, jinekomasti, galaktore	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
512	L106270	Prostat Spesifik Antijen (Serbest PSA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 90 gün	Benign ve malign prostat hipertrofisinin ayırımında	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
513	L106280	Prostat Spesifik Antijen (Total PSA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 90 gün	Prostat kanseri	CMIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
514	L106290	*Prostatik Asit Fosfataz (PAP)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün	Prostat kanseri	Fotometrik	Hafta içi her gün	Aynı gün saat 18:00
515	L106340	*Protein C Aktivite	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Tromboz riskinin değerlendirilmesi	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
516	L106350	*Protein C Antijen	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Tromboz riskinin değerlendirilmesi	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
517	L106370	*Protein Eletroforezi (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 5 gün Ortam - 3 gün	İdrar proteinlerinin incelenmesi, karaciğer hastalıkları, myeloma, kollajen hastalıklar, gammopatiler, sırt ağrısı, artrit, amiloidoz, anemi, inflamatuar hastalıklar	Jel Elektroforez	Cuma (Saat 15:00 'e kadar gelen numuneler çalışmaya alınır: 15:00 'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 16:00
518	L106360	*Protein Eletroforezi (Serum)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Serum proteinlerinin incelenmesi, karaciğer hastalıkları, myeloma, kollajen hastalıklar, gammopatiler, sırt ağrısı, artrit, amiloidoz, anemi, inflamatuar hastalıklar	Kapiler Elektroforez	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
519	L106390	*Protein S Aktivite	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Tromboz riskinin değerlendirilmesi	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
520	L106400	*Protein S Antijen	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Tromboz riskinin değerlendirilmesi	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
521	L106430	Protrombin Zamanı (PTZ)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Koagülasyon bozuklukları, tedavi takibi (K vitamini antagonistleri)	Koagülometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 1 saat sonra
522	L106440	Pseudokolinesteraz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosfat zehirlenmeleri	Fotometrik	Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
523	L105960	PTH (Parathormon)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün	Hiperparatiroidizm, multiple endokrin adenomatozis, ektopik parathormon üretimi, hipoparatiroidizm, hi-perkalsemi, sarkoidoz, hipertiroidi, immobilizasyon, Paget hastalığı, akromegali		Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
524	L103811	*Quantiferon-TB Gold Plus (IGRA)	Numune tipi-miktarı Tam kan – 4 özel Quantiferon tüpüne, her tüpe 1 ml. Sıcaklık-zaman Oda ısısında (17-25 derece) İnkübasyon ve santrifüj sonrası buzdolabında (4 derece)	Tüberküloz infeksiyonu tanısında	EIA	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi (Eğer numuneler inkübe edilmeden gönderilirse testin çalışılması bir sonraki çalışma gününe kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
525	L102640	*Redüktan madde (Gaita)	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 1g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün	Karbonhidrat emilim bozukluğunun araştırılması	KALİTATİF	Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
526	L102560	*Redüktan Madde (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 21 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 21 gün	Sekonder hipertansiyon şüphesi, Conn sendromu (Primer hiperaldosteronizm)	KALİTATİF	Hafta içi hergün saat:12.00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
527	L106490	*Renin	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Sekonder hipertansiyon şüphesi, Conn sendromu (Primer hiperaldosteronizm)	CLIA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma	4 iş günü içerisinde saat 18:00
528	L106510	*Reptilase	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Reptilaz trombine benzer etki gösteren bir yılan ze-hiridir. Trombin gibi fibrinojenden fibrinopeptid A'yı ayırır. Ancak fibrinopeptid B'yi oluşturamaz . Reptilaz zamanı heparin varlığında normal sonuç verir. Böy-lece kan örneğinde heparin bulaşması olup olmadığı anlaşılır.	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
529	L106560	*Reverse T3	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Tiroit hastalıklarının değerlendirilmesinde, Hashimoto Tiroiditinin değerlendirilmesinde	EIA	CUMA (Perşembe saat 18:00 'e kadar gelen numuneler kabul edilir)	3 gün sonra 18:00
530		*Retikülosit	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün Ortam - 1 gün	Hemolitik anemi, vitamin B12 ve demir tedavisinin takibi	Cell Counter	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
531	L106540	*Retinol Binding Protein (RBP)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Böbrek fonksiyonları ve malnütrisyon	Nefelometrik	Hafta içi her gün	Aynı gün saat 18:00
532	L106570	Romatoid Faktör (RF)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Romatoid artrit, kollajenozlar,kronik poliartrit	Türbidimetrik	Pazartesi 13:30 (Saat 13:30 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
533	907980	Rotavirüs antijeni (Gaita)	Numune tipi - Miktarı Gaita - 5 g (min 1g) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Buzdolabında - 3 gün	Gastrointestinal enfeksiyonlar (özellikle çocuklarda)	İmmunokromotografik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
534	912700	*RsV IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	mevcut yada geçirilmiş Respiratory syncytial virus (RsV) enfeksiyonlarının tanısında	EIA	Salı saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
535	912710	*RsV IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	mevcut yada geçirilmiş Respiratory syncytial virus (RsV) enfeksiyonlarının tanısında	EIA	Salı saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
536	906820	*Rubella IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip	CLIA/ELISA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
537	906820	*Rubella IgG (Vidas)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
538	908000	*Rubella IgG Avidite	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunması	EIA	Pazartesi saat 10:00 (saat 09:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
539	906840	*Rubella IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip	CLIA/ELISA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
540	906840	*Rubella IgM (Vidas)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip	EIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
541	908040	*RSV DFA (Solunum sinsityal virusu)	Numune tipi - Miktarı Üst solunum yolu örnekleri: Nazofaringeal swab (NF Sürüntü) ve Faringeal (Boğaz sürüntü) swab. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 72 saat Dondurulmuş - 1 ay Ortam - 4 Saat	Respiratory syncytial virus (RsV) enfeksiyonlarının tanısında	Immunokromotografik	Pazartesi,Salı, Çarşamba, Perşembe,Cuma ve Cumartesi	Ertesi gün saat 18:00
542		*Covid Grip RSV RT-PCR	Numune tipi - Miktarı Solunum yolu örnekleri: Orofarengeal ve nazofaringeal (aspirat, dakron eküvyon ile sürüntü veya yıkama) veya trakeal aspirat. Minimum 1.0 mL. viral transport medium içerisinde. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 72 saat Dondurulmuş - 1 ay Ortam - 1 gün		PCR	Her gün; 15:00' a kadar kabul edilen ornekler aksam 18:00. 15:00'dan sonra kabul edilen ornekler ertesi gun aksam sonuclanır.	her gün; 15:00' a kadar kabul edilen ornekler aksam 18:00. 15:00'dan sonra kabul edilen ornekler ertesi gun aksam sonuclanır.
543	700060	Saçlı Deride Mantar Aranması	Numune tipi - Miktarı Saçlı deri kazıntısı Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 14 gün	İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi	Mikroskobik	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre 30 gün içerisinde saat 18:00
544	906120	Saçta Mantar Aranması	Numune tipi - Miktarı Saçlı deri kazıntısı Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Ortam - 14 gün	İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi	Mikroskobik	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre 30 gün içerisinde saat 18:00
545	L106620	*Safra asitleri	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 1 gün	Karaciğer hastalıkları	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
546	L114590	*Salisilat (Salisilik asit)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 1 gün	Toksisite değerlendirilmesinde kullanılır	HPLC	Salı günleri saat 13:00 (Saat 12:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
547	907222	SARS-CoV-2 (Covid19) IgG Antikoru	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında(tercih edilir) - 72 saat Dondurulmuş - 1 ay Ortam - 1 gün		İmmunoassay	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
548	907223	SARS-CoV-2 (Covid19) IgM Antikoru	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında(tercih edilir) - 72 saat Dondurulmuş - 1 ay Ortam - 1 gün		İmmunoassay	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
549	908115	SARS-CoV-2 (Covid19) RNA	Numune tipi - Miktarı Kombine burun ve boğaz sürüntüsü Sıcaklık - Zaman Buzdolabında(tercih edilir) - 72 saat Dondurulmuş - 1 ay Ortam - 1 gün		PCR	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
550	L106650	Sedimantasyon (1 Saat) ESR (Eritrosit Sedimantasyon Hızı)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı kan; sitratlı sedim tüplerine işaretli çizgiye kadar kan alınır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 4 saat	Romatizmal hastalıklar, ateşli enfeksiyonlar vb CRP, akut inflamasyon yanıtının değerlendirilmesinde ESR'den daha duyarlı ve daha spesifik bir belirteçtir.	Fotosedimantasyon Yöntemi	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
551	L106660	*Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 60 gün	Androjen yetersizliği, tedavi takibi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
552	L106670	*Selenyum	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Eksiklik, mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün çalışılır:	İki gün sonra saat 18:00
553	L106670	*Selenyum, Eritrosit içi	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Eksiklik, mesleki maruziyet	ICP-MS	Hafta içi her gün (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
554		*Selofan Bant (Oksiyur Yumurtası Aranması)	Numune tipi - Miktarı Numune alınması için laboratuvara danışınız. Sıcaklık - Zaman Numune saklanması için laboratuvara danışınız.	Enterobius vermicularis yumurtası aranması	Mikroskobik	Hafta içi her gün (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	ertesi gün saat 18:00
555	L100100	*Serotonin	Numune tipi - Miktarı Serum, Tam Kan, EDTA'lı Plazma - 1 mL Sıcaklık - Zaman Soğutulmuş - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Karsinoid sendromun tanı ve takibi Not: Hastalar, toplamadan önce ya da 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hıyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık, ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir.	HPLC	Pazartesi saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
556	L100100	*Serotonin	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 1 mL (min 0.5 mL) 24 saatlik İdrar (%50 Asetik asit üzerine İdrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün	Karsinoid sendromun tanı ve takibi Not: Hastalar, toplamadan önce ya da 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hıyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık, ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir.	LC-MS/MS	Pazartesi ve Perşembe saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
557	L106790	*Seruloplazmin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Wilson hastalığı	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
558	L114610	*Siklosporin A	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Tedavi takibi (transplantasyon)	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
559	L114640	*Sirolimus (Rapamune)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Tedavi Takibi	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
560	L106850	*Sistatin C	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 7 gün	Böbrek yetmezliği	Nefelometrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
561	L110560 (24 Saatlik idrar) L110550 (Spot idrar)	*Sistin, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 70 gün	Sistinüri	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün saat 18:00
562	L106900 (24 Saatlik idrar) L106890 (Spot idrar)	*Sitrat (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Not: 24 saatlik idrar numunesi toplamadan önce idrar toplama kabına 30 ml toluen ilave edilmelidir. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Nefrolitiazis	Fotometrik	Pazartesi saat12:00 (saat:13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
563	L106950 (Vücut sıvısı) L106950 (Plevral sıvı) L106950 (BOS)	*Sodyum	Numune tipi - Miktarı Serum, BOS, Mayi - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 14 gün	Elektrolit bozuklukları, renal yetmezlik, diüretik tedavisi	ISE	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
564	L106930 (Spot idrar) L106940 (24 Saatlik idrar)	*Sodyum (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Böbrek yetmezliği, sodyum kaybı sendromu	ISE	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
565	L106910 (Serum)	Sodyum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 14 gün	Elektrolit bozuklukları, renal yetmezlik, diüretik tedavisi	ISE	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
566	705320	*Soğuk Aglütininler	Numune tipi - Miktarı Serum + Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Serumda soğuk aglütininlerin varlığının belirlenmesinde	Aglütinasyon	Hafta içi her gün saat 12:00 (saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
567		*Soluble Liver Antigen (SLA)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 2 gün		ELISA	Perşembe saat 10:00 (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma gün saat 18:00
568	906250	Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü	Miktar İdeal (En az) : 5 mL (2mL) Kap/Kapak : SK Transport / Saklama Koşulları : En kısa sürede (<2 saat) laboratuvara ulaştırılmalıdır.Transfer süresi 2 saati aşacak örnekler 2-8oC'de en fazla 24 saat saklanabilir.	Üreme olursa identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testi çalışılır.	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
569	L103800	*Somatomedin C (IGF1)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Büyüme bozuklukları	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
570	704570	Sperm Morfolojisi (Kruger)	Numune tipi - Miktarı Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat	Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi	Mikroskobik (özel boyama ile)	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
571	704640	Spermogram	Numune tipi - Miktarı Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat	Erkek infertilitesinin araştırılması	Mikroskobik / CASA(Computer assisted semen analysis)	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
572	L109010	*Spesifik IgE C1 Penisilol G	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
573	L109020	*Spesifik IgE C2 Penisilol V	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
574	L107870	*Spesifik IgE C203 Ampisillin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
575	L107860	*Spesifik IgE C204 Amoksisillin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
576	L108210	*Spesifik IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
577	L108210	*Spesifik IgE D2 (Dermatophagoides farinae)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
578	L107820	*Spesifik IgE DP1 MİTE (Akar) Karışımı -D1 Dermatophagoides p. -D2 Dermatophagoides farinae -D3 Dermatophagoides m. -D71 Lepidoglyphus destructor -D72 Tyrophagus putrescentiae -D73 Glycyphagus domesticus -D74 Euroglyphus maynei -D201 Blomia tropicalis	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
579	L108640	*Spesifik IgE E1 Kedi epiteli ve kılı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
580	L108760	*Spesifik IgE E5 Köpek Tüyü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
581		*Spesifik IgE E72 Mouse Urine	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
582	L108910	*Spesifik IgE E78 Muhabbet Kuş Tüyü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
583		*Spesifik IgE E91 Papağan Tüyü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
584	L107780	*Spesifik IgE EP1 Hayvan Tüyleri Karışımı - E1 Kedi Tüyü-Epiteli - E3 At Tüyü - E4 İnek Tüyü - E5 Köpek Tüyü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
585	L107780	*Spesifik IgE EP2 Hayvan Tüyleri Karışımı - E1 Kedi Tüyü-Epiteli - E5 Köpek Tüyü - E6 Hint Domuzu Tüyü - E87 Sıçan Tüyü - E88 Fare Tüyü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
586	L107780	*Spesifik IgE EP71 Hayvan Tüyleri Karışımı -E70 Kaz Tüyü -E85 Tavuk Tüyü -E86 Ördek Tüyü -E89 Hindi Tüyü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
587	L107780	*Spesifik IgE EP72 Hayvan Tüyleri Karışımı - E78 Muhabbet kuşu Tüyü - E213 Papağan Tüyü - E201 Kanarya Tüyü - E214 İspinoz Tüyü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
588	L409300	*Spesifik IgE F1 Yumurta Akı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
589	L109150	*Spesifik IgE F10 Susam	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
590	L10180	*Spesifik IgE F105 Çikolata	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
591	L108530	*Spesifik IgE F11 Karabuğday	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
592	L109260	*Spesifik IgE F13 Yer Fıstığı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
593	L109140	*Spesifik IgE F14 Soya Fasülyesi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
594	L108280	*Spesifik IgE F17 Fındık	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
595	L108440	*Spesifik IgE F2 İnek Sütü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
596	L107980	*Spesifik IgE F20 Badem	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
597	L107890	*Spesifik IgE F203 Antep Fıstığı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
598	L108030	*Spesifik IgE F204 Alabalık	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
599	L108960	*Spesifik IgE F233 Ovomucoid	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
600	L108700	*Spesifik IgE F242 Kiraz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
601	L109060	*Spesifik IgE F244 Salatalık	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
602	L109290	*Spesifik IgE F245 Yumurta	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
603	L108010	*Spesifik IgE F247 Bal	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
604	L108230	*Spesifik IgE F25 Domates	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
605	L108160	*Spesifik IgE F253 Çam Fıstığı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
606	L108150	*Spesifik IgE F256 Ceviz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
607	903720	*Spesifik IgE F26 Domuz Eti	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
608	L108200	*Spesifik IgE F27 Kırmızı Et	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
609	L108900	*Spesifik IgE F3 Morina Balığı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
610	L108940	*Spesifik IgE F309 Nohut	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
611	L109210	*Spesifik IgE F315 Taze Fasülye	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
612	L109050	*Spesifik IgE F33 Portakal	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
613	L108990	*Spesifik IgE F35 Patates	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
614	L109170	*Spesifik IgE F360 Yoğurt	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
615	L108130	*Spesifik IgE F4 Buğday Unu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
616	L108630	*Spesifik IgE F409 Keçi Sütü	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
617	L109130	*Spesifik IgE F41 Somon	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
618	L108190	*Spesifik IgE F44 Çilek	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
619	L108240	*Spesifik IgE F45 Ekmek Mayası	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
620	L108170	*Spesifik IgE F5 Çavdar	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
621	L109280	*Spesifik IgE F7 Yulaf	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
622	L109310	*Spesifik IgE F75 Yumurta Sarısı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
623		*Spesifik IgE F47 Sarımsak	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
624	L109310	*Spesifik IgE F75 Yumurta Sarısı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
625	L107840	*Spesifik IgE F76 Alfa Laktalbumin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
626	L108070	*Spesifik IgE F77 Beta Laktoglobülin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
627	L108600	*Spesifik IgE F78 Kazein	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
628	L108320	*Spesifik IgE F79 Gluten	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
629	L108890	*Spesifik IgE F8 Mısır	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
630	L109200	*Spesifik IgE F83 Tavuk Eti	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
631	L108700	*Spesifik IgE F84 Kivi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
632	L108740	*Spesifik IgE F88 Koyun Eti	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
633	L109040	*Spesifik IgE F9 Pirinç	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
634	L108920	*Spesifik IgE F92 Muz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
635	L108490	*Spesifik IgE F93 Kakao	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
636	L109180	*Spesifik IgE F95 Şeftali	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
637	L107770	*Spesifik IgE FP1 Kuruyemiş Karışımı - F13 Yerfıstığı - F17 Fındık - F18 Brezilya Fındığı - F20 Badem - F36 Hindistan Cevizi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
638	L107710	*Spesifik IgE FP13 Sebze Gıda Karışımı - F12 Yesil Bezelye - F15 Beyaz Fasulye - F31 Havuç - F35 Patates	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
639	L107740	*Spesifik IgE FP15 Meyve Karışımı - F33 Portakal - F49 Elma - F92 Muz - F95 Seftali	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
640	L107740	*Spesifik IgE FP2-Balık Paneli - F3 MorinaBalığı - F24 Karides - F37 KaraKabukMidyesi - F40 TonBalığı - F41 Somon	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
641	L107750	*Spesifik IgE FP3 Hububat Karışımı - F4 Buğday - F7 Yulaf - F8 Mısır - F10 Susam tohumu - F11 Karabuğday	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
642	L107700	*Spesifik IgE FP7 Beslenme Tarama - F1 Yumurta Akı - F2 Süt - F4 Buğday - F9 Pirinç - F13 Yerfistığı - F14 Soya fasulyesi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
643	L107760	*Spesifik IgE FP73 Gıda Et Paneli - F26 Domuz Eti - F27 Sığır Eti - F83 Tavuk Eti - F88 Koyun Eti	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
644	L107650	*Spesifik IgE GP1 Çayır (Ot-Polen) Karışımı - G3 Meyve Otu - G4 Çayır Otu - G5 Delice Otu - G6 Timoti Otu - G8 Çayır Salkım Otu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
645	L107650	*Spesifik IgE GP2 Çayır (Ot-Polen) Karışımı -G2 Domuz ayrığı Otu -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu -G8 Çayır Salkım Otu -G10 Darı Otu -G17 Bahia Otu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
646	L107810	* Spesifik IgE GP3 Çimen paneli -G1 Kokulu Yonca -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu -G12 Çavdar -G13 Kadife Çimi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
647	L107820	*Spesifik IgE HP1 Toz Karışımı - D1 Dermatophagoides p. - D2 Dermatophagoides farinae - H1 Ev Tozu - I6 Hamam Böceği	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
648	L107820	*Spesifik IgE H1 Ev Tozu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
649	L108000	*Spesifik IgE I1 Bal Arısı Zehiri	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
650	L109250	*Spesifik IgE I2 Eşekarısı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
651	L109250	*Spesifik IgE I3 Yaban Arısı Zehiri	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
652	L109250	*Spesifik IgE I4 Sarıca Arı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
653	L109250	*Spesifik IgE I5 Sarı Eşekarısı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
654	L108360	*Spesifik IgE I6 Hamamböceği	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
655	L109110	*Spesifik IgE I71 Sivrisinek	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
656	L108450	*Spesifik IgE IP8 Solunum Tarama - D1 Dermatophagoides p. - E1 Kedi Tüyü-Epiteli - E5 Köpek Tüyü - G6 Timoti Otu - G12 Çavdar - M2 Cladosporium herbarum - T3 Hus Ağacı - W6 Mist Otu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
657	L108790	*Spesifik IgE K82 Latex	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
658	L109030	*Spesifik IgE M1 Penicillium Notatum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
659	L108710	*Spesifik IgE M2 Cladosporium herbarum	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
660	L107940	*Spesifik IgE M207 Aspergillus Niger	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
661	L107940	*Spesifik IgE M3 Aspergillus Fumigatus	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
662	L108510	*Spesifik IgE M5 Candida Albicans	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
663	L107850	*Spesifik IgE M6 Alternaria Alternaria (A. Tenuis)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
664	L107790	*Spesifik IgE MP1 Küf Karışımı - M1 Penicillium notatum - M2 Cladosporium herbarum - M3 Aspergillus fumigatus - M5 Candida albicans - M6 Alternaria Alternaria (A. Tenuis)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
665	L108440	*Spesifik IgE P1-Ascaris	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
666	L107640	*Spesifik IgE T11 Çınar Ağacı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
667	L107640	*Spesifik IgE T12 Söğüt Ağacı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
668	L107640	*Spesifik IgE T14 Kavak	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
669	L109320	*Spesifik IgE T9 Zeytin ağacı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
670	L107640	*Spesifik IgE TP1 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T3 Hus Ağacı - T7 Mese Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T10 Ceviz Ağacı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
671	L107640	*Spesifik IgE TP2 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T7 Mese Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T14 Kavak - T22 Alıç	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
672	L107640	*Spesifik IgE TP5 Ağaç Karışımı - T2 Kızıl Ağaç - T4 Fındık Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı -T12 Söğüt Ağacı - T14 Kavak Ağacı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
673	L107640	*Spesifik IgE TP7 Ağaç Karışımı - T9 Zeytin Ağacı - T12 Söğüt Ağacı - T16 Beyaz Çam Ağacı - T18 Ökaliptus Ağacı - T19 Akasya Ağacı - T21 Melaluka Ağacı	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
674	L108880	*Spesifik IgE W6 Mugwort (Mist otu)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
675	L107810	*Spesifik IgE WP1 Yabani Ot Karışımı - W1 Kanarya Otu - W6 Mist Otu - W9 Dar yapraklı sinir Otu - W10 Ak kaz ayağı Otu - W11 Rus Deve Dikeni Otu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
676	L107810	* Spesifik IgE WP3 Yabani Ot Karışımı - W6 Mist Otu - W9 Dar yapraklı sinir Otu - W10 Ak kaz ayağı Otu - W12 Altın basak Otu - W20 Isırgan Otu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 90 gün	Allerjik diyatez	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
677	907020	*SS-A (Anti Ro) Antikoru	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Sjögren sendromu, SLE, neonatal lupus	Immunblot - EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
678	907030	*SS-B (Anti La) Antikoru	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün	Sjögren sendromu, SLE, neonatal lupus	Immunblot - EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 18:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 18:00)	Çarşamba ve Cuma 18:00 (Salı günü çalışılan örnekler Çarşamba 18:00, perşembe çalışılan örnekler için Cuma 18:00)
679	L102640	*Şeker kromotografisi (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Glukozürinin değerlendirilmesi (Laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz ve sakkaroz araştırılır)	RIA	Hafta içi her gün	7 iş günü içerisinde saat 18:00
680		*T3 (triiyodotironin)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Hipertiroidizm, tedavi takibi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
681		*T4 (Tetraiyodotironin)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 3 gün	Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
682	L114680	*Takrolimus (FK 506)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	İmmünsüpressif tedavi takibi	LC-MS/MS	Salı-Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
683		*Talyum	Numune tipi - Miktarı Heparinli Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Talyum endüstriyel olarak optik camların üretiminde, yarı iletkenlerde, bazı alaşımların analizinde, düşük sıcaklık termometrelerinde, devre anahtarı üretiminde, kimya sanayinde, havai fişek üretiminde ve fare zehiri üretiminde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde çalışanlarda maruziyet nedeniyle bakılmaktadır.	ICP-MS	Hafta içi her gün	Üç gün sonra saat 18:00
684	911370	*TCA (Trikloro Asetikasit)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 3 gün	Trikoloro Asetikasit maruziyetinin araştırılması	Kolorimetrik	Çarşamba saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
685	911370	*TCE (Trikloroetilen)	Numune tipi - Miktarı İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 180 gün	Mesleki maruziyet ve Trikloreten araştırılması	GC MS	Çarşamba 12:00 (12:00 den sonra gelen örnekler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
686	L114700	*Teofilin	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Tedavi takibi	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
687	L106780	*Testosteron (Serbest)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 60 gün	Erkeklerde: libido bozuklukları, empotans, infertilite, testiküler atrofi, prematüre veya gecikmiş püberte. Kadınlarda: hirsutism, polikistik over sendromu, amenore, libido bozuklukları	CLIA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma	4 iş günü içerisinde saat 18:00
688	L107160	Testosteron (Total)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 60 gün	Androjen yetersizliği, prematüre veya gecikmiş püberte, tedavi takibi	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
689	908050	*Tetanoz antikor	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Tetanoz aşısının etkili olup olmadığının tespiti için kullanılır.	EIA	Salı saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
690	906120	Tırnakta Mantar Aranması	Numune tipi - Miktarı Saç, tırnak, cilt örnekleri Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Tırnakta dermatofitlerin belirlenmesi	Mikroskobik	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre 30 gün içerisinde saat 18:00
691	L107050	*Tiroglobulin (Tg)	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Tiroid bezi kanserinde tedavi takibi	ECLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
692	L107070	*Tiroid Stimule Edici Immunglobulin (TSI)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 60 gün Ortam - 1 gün	Hipertiroidizm, Basedow hastalığı	RIA	Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
693	L107080	*Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir. Genellik le TsH düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve TT4 düzeylerinin, TT4 ile FT4 düzeyleri arasında uyumsuzluk olan durumların, aşırı artmış veya azalmış TT4 düzeylerinin ve konjenital TBG eksikliklerinin değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
694		*Titanyum	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Titanyumdioksit boya, vernik ve cila sanayilerinde renk verici madde olarak kullanılır.Titanyumun bir başka bölümü kâğıt sanayiinde kullanılır. Ayrıca titanyum ve demir alaşımı çelik sanayiinde kullanılır. Bu sektörlerde çalışanlarda maruziyetin tespiti için kullanılır.	ICP-MS	Hafta içi her gün	Üç gün sonra saat 18:00
695		*Tiyosiyanat, İdrar	Numune tipi - Miktarı İdrar - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 20 gün		Spektrofotometri	Çarşamba günü saat 15:00'e kadar gelen numuneler kabul edilir:	İki gün sonra saat 18:00
696	L102890	Tokluk Kan Şekeri	Numune tipi - Miktarı Serum, Florid/Oksalatlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 7 gün	Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesi	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
697		*Toluen	Numune tipi - Miktarı İdrar - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 5 gün	Toluen maruziyetinin araştırılması	GC MS	Çarşamba saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Bir hafta sonra saat 18:00
698	L114710	*Topiramat	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün	Topiramat, geniş spektrumlu etki mekanizmasına sahip yeni kuşak bir antikonvülzandır. Topiramat bipolar bozukluk, alkol/ madde yoksunluğu ve bağımlılığı,ağrılı sendromlar, dürtü kontrol bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve yeme bozuklukları gibi farklı psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır.	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki gün sonra saat 18:00
699		*Total Antioksidan Aktivite	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 28 gün	oksidatif stres	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 15:00 (saat 16:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
700		*Total Oksidan Aktivite	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 28 gün	oksidatif stres	Fotometrik	Hafta içi her gün saat 15:00 (saat 16:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
701	L106300 (Serum)	Total Protein	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2 8 °C - 4 hafta 15-25 °C- 6 gün	Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütris-yon, etyolojisi bilinmeyen ödem	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
702	L106330 (BOS) L106330 (Vücut sıvısı)	*Total Protein	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün	K+K715+E715	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
703	L106320 (24 Saatlik idrar) L106310 (Spot idrar)	*Total Protein (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 1 gün	Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütris-yon, etyolojisi bilinmeyen ödem	Türibidimetrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
704	906910	*Toxoplazma IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati	CLIA/ELISA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
705	906910	*Toxoplazma IgG (Vidas)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati	FIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
706	908070	*Toxoplazma IgG Avidite Testi	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Gebeliğin ilk dört ayında toksoplazma !g M varlığında ilave tanısal bilgi	Elfa	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
707	906930	*Toxoplazma IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati	CLIA/ELISA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
708	906930	*Toxoplazma IgM (Vidas)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati	FIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
709	L107170	*Transferrin	Numune tipi - Miktarı Serum, İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 7 gün	Demir eksikliği anemisi, demir taşıma bozuklukları	Türibidimetrik	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
710		*Transferrin Satürasyonu	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün Ortam - 1 gün	Hemokromatozis	Fotometrik	Pazartesi,Salı,Çarşamba, Perşembe,Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
711	908090	*Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA)	Serum 1 mL (min 0.5 mL) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl	Sitiliz şüphesi, obstetrik takip	CLIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
712		*Treponema pallidum PCR	Numune tipi - Miktarı Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, İdrar Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) Dondurulmuş - 180 gün Ortam	Treponema pallidum parazitinin belirlenmesi	Real Time PCR	Salı Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
713	906270	*Trichomonas Aranması	Numune tipi - Miktarı Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, İdrar Sıcaklık - Zaman Buzdolabında Ortam (tercih edilir)	Trikomonas enfeksiyonu şüphesi	Mikroskobik	Hafta içi her gün saat 12:00 (saat 13:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
714		*Trichomonas Vaginalis PCR	Numune tipi - Miktarı Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, İdrar Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) Dondurulmuş - 180 gün Ortam	Trikomonas vaginalis parazitinin belirlenmesi	Real Time PCR	Salı Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
715	L107250	Trigliserid	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (2-8°C) - 7 gün 15-25°C - 1 gün	Yağ metabolizması bozuklukları, tedavi takibi	Enzimatik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
716	L107290	*Triptaz	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 5 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Anaflaktik şok, allerjik rinit, sistemik mastositozis	FEIA	15 günde bir Pazartesi çalışılır	Ertesi gün saat 18.00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
717	L107310	*Trombin zamanı	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Kanama bozukluklarının araştırılması	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
718	L107350	*Trombosit fonksiyon agregasyon testleri (kollajen, ADP, epinefrin, ristosetin olarak 4 ayrı test çalışılır)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Randevu alınarak hastanın laboratuvara gelmesi gerekir. Sıcaklık - Zaman Oda Isısında - 6 Saat	Trombositopeni nedenlerinin araştırılması (905.520 x 4 kodundan fatura edilir)	Platelet fonksiyon analizörü	Çarşamba günü saat 15:00'e kadar gelen numuneler kabul edilir.	Aynı gün saat 18:00
719	L107360	*Troponin I	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 1 gün	Anstabil anjina pektoris, akut ve subakut miyokard infarktüsü	CMIA	Hafta içi her gün	Üç saat sonra
720	904030	TSH (Tiroid Stimülan Hormon)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün Ortam - 7 gün	Şüpheli tiroid hastalıklarının araştırılması	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
721	L107390	*TSH Reseptör Antikoru	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 30 gün	Hipertiroidizm, Basedow hastalığı	RIA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma	4 iş günü içerisinde saat 18:00
722		*t-t Mukonik asit	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün		HPLC	Çarşamba 12:00 (12:00 den sonra gelen örnekler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma günü saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
723	908290	*Tüberkülöz PCR	Numune tipi - Miktarı Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve Diğer: vücut sıvıları - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Tüberküloz PCR, Mycobacterium tuberculosis' in klinik örneklerde saptanmasını sağlayan özgül bir DNA çoğaltma yöntemidir. Bu yöntemde IS6110 (insertion sequence 6110) gen bölgesi özgül primerler kullanılarak çoğaltılır. Bu primerler ile Mycobacterium tuberculosis complex grubuna giren M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum ve M. microti DNA' sı çoğaltılabilir ve bu bakterilerin varlığı klinik örneklerde gösterilebilir. M. microti sadece hayvanlarda enfeksiyon yapan bir mikroorganizmadır. M. bovis nadiren hayvanlardan insanlara geçebilir. M. africanum ise Afrika' nın tropikal bölgelerinde rastlanan bir enfeksiyon etkenidir. M. tuberculosis tüm dünyada tüberkülozun en önemli etkenidir. Son yıllarda dünyada tüberkülozlu sayısının arttığı görülmüş ve bunda büyük kentlerde nüfus yoğunlaşmasına bağlı bulaşmanın artışı ve AIDS'in yaygınlaşmasının önemli olduğu düşünülmüştür. Nüfus göçünün yüksek olduğu Marmara bölgesi son yıllarda Türkiye' de tüberküloz görülme sıklığının en yüksek olduğu bölgeler arasına girmiştir. Mikroskobi ile tüberküloz tanısı hızlı bir şekilde konabilir. Ancak mikroskobinin duyarlılığı düşüktür ve tüberküloz basilininin saptanabilmesi için örneğin mililitresinde en az 5000-10000 mikobakteri bulunması gerekmektedir. Kültür canlı basillerin gösterilmesinde en duyarlı yöntemlerden biri olmasına karşın, klasik kültür besiyeri Löwenstein-Jensen ile tüberküloz basilinin üretilmesi, 3-8 hafta sürmektedir. Bu süre hızlı kültür sistemleri ile yarıya indirilebilmektedir. PCR ile M. tuberculosis DNA' sının klinik örneklerde saptanması hızlı ve duyarlı tanı sağlayan bir yöntemdir. Buna karşın bakterinin kültürde üretilmesi, bütün antitüberküloz ilaçlara karşı duyarlılık saptanması için gerekli bir işlemdir. PCR ile M. tuberculosis saptanması mutlaka klasik tanı yöntemleri olan mikroskobi, kültür (klasik veya hızlı kültür sistemleri) ile bir arada kullanılmalıdır. Kullanımı: Klinik ve veya radyolojik olarak tüberküloz düşünülen hastalarda, klasik mikroskobi ve kültür gibi yöntemlere yardımcı olarak tüberküloz tanısı PCR ile konabilir. Diğer klasik yöntemlerle tüberküloz varlığı saptanamamış	Bkz. Mikobakteri tuberculosis PCR	Bkz: Mikobakteri tuberculosis PCR	Bkz. Mikobakteri tuberculosis PCR
724	906280	*Ureaplasma Urealitikum Kültürü	Numune tipi - Miktarı Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Üreaplazma ürealitikum bakterisinin tespiti	Kültür	Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
725		*Ureaplasma Urealyticum PCR	Numune tipi - Miktarı Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Ureaplasma Urealyticumbelirlenmesi	Real Time PCR	Salı Saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	Ertesi gün saat 18:00
726		Uyuşturucu Tarama Testi	Numune tipi - Miktarı İdrar - 10 mL (min 5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 3 gün	Uyuşturucu taraması	Strip	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
727	L107410	Üçlü Tarama Testi (İkinci Trimester Tarama Testi)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Down sendromlu gebelik riski	CLIA	Hafta içi her gün	İki gün sonra saat 18:00
728	L107420	Üre	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman 2-25°C - 7 gün	Bkz. Kan üre azotu	Enzimatik Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
729	L107440 (24 Saatlik idrar) L107430 (Spot idrar)	*Üre (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Kronik böbrek hastalıklarının takibi, azot dengesinin değerlendirilmesi	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
730	905680	Üretral Akıntı Kültürü	Numune tipi - Miktarı Üretral akıntı - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Üretral enfeksiyon tanısı	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
731	L107460	Ürik Asit	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 180 gün	Gut artriti, tedavi takibi	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
732	L107480 (24 Saatlik idrar) L107470 (Spot idrar)	*Ürik Asit (İdrar)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 2 mL (min 1 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Nefrolitiazis, renal ürik asit ekskresyonunun rapor-lanması	Fotometrik	Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi	Dört saat sonra
733	905676	Vajinal Kültür	Numune tipi - Miktarı Vajinal - servikal swab Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün	Vajinal enfeksiyonlar	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
734	L114730	*Valproik Asit	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Tedavi takibi	CMIA	Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
735		*Vanadyum	Numune tipi - Miktarı Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 7 gün Ortam - 7 gün	Çelikten daha esnek ve aşınmayla şoklara dayanıklı özel çeliklerin hazırlanmasında kullanılan ferrova-nadyumlarm üretiminde yararlanılır. Seramikçilik ve camcılıkta (mavi, kahverengi ve eflatun boyalar) vanadyumdan pigment olarak yararlanılır. Bazı vanadyum tuzları böcek öldürücü olarak kullanılırlar. Oligo-element olarak biyokimyasal mekanizmalara da katılır. Bu sektörlerde çalışanlarda maruziyetin tespiti için kullanılır.	ICP-MS	Hafta İçi her gün	Üç gün sonra saat 18:00
736	L107500 (24 Saatlik idrar) L107490 (Spot idrar)	*Vanil Mandelik Asit (VMA)	Numune tipi - Miktarı İdrar (Spot İdrar, 24 Saatlik İdrar) - 5 mL (min 2.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 3 gün	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionö-roma, hipertansiyon ayırıcı tanısı	LC-MS/MS	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
737	L114740	*Vankomisin	Numune tipi - Miktarı Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 365 gün Ortam - 2 gün	Tedavi takibi	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır:)	İki iş günü sonra saat 18:00
738	908100	*Varicella Zoster Virus (VZV) IgG	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Gebelik esnasında enfekte kişiyle karşılaşıldığında immünitenin belirlenmesi	EIA	Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
739	908110	*Varicella Zoster Virus (VZV) IgM	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Su çiçeği, Herpes Zoster enfeksiyonu	EIA	Perşembe saat 12:00 (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
740	906290	VDRL (RPR)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Sifiliz şüphesi, obstetrik takip	Immunokromotoğrafik	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
741	L107510	*Vitamin A (Retinol)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Malnütrisyon, gece körlüğü, deri kuruluğu, saç dökülmesi, aşırı tüketim (vitamin tedavisi)	LC-MS/MS	Pazartesi saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
742		*Vitamin B1 (Tiamin)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Vitamin eksikliklerinin araştırılması	HPLC	Perşembe saat 13:00 (12:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Pazartesi günü saat 18:00
743	L107520	Vitamin B12 (Siyanokobalamin)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 90 gün	Kronik gastrik bozukluklar, pernisiyöz anemi	CLIA	Hafta içi her gün (Saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 3 saat sonra
744		*Vitamin B2 (Riboflavin)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında - 7 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün	Vitamin eksikliklerinin araştırılması	HPLC	Perşembe saat 13:00 (12:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Pazartesi günü saat 18:00
745		*Vitamin B6 (Pridoksal fosfat)	Numune tipi - Miktarı EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün	Vitamin eksikliklerinin araştırılması	HPLC	Perşembe saat 13:00 (12:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Pazartesi günü saat 18:00
746	L107530	*Vitamin C (Askorbik asit)	Numune tipi - Miktarı Heparinli Plazma (Çöktürülmüş plazma; %10'luk methafosforik asit 1:1 oranında ilave edilir santrifüj edilip üst faz alınır dondurularak gönderilir - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	Malnütrisyon, C vitamini eksikliği veya fazlalığının değerlendirilmesi	HPLC	Pazartesi saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
747	L107540	*Vitamin E (Alfa-tokoferol)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 14 gün	Eksiklik sendromu	LC-MS/MS	Pazartesi saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
748		*Vitamin H (Biotin)	Numune tipi - Miktarı Serum - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Buzdolabı (tercih edilir) - 14 gün Dondurulmuş - 14 gün	Vitamin eksikliklerinin araştırılması	EIA	Salı saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

Sıra No	Sut Kodu	Test Adı	Numune Tipi / Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
749	L107570	*Von Willebrand faktör aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	von Willebrand sendromu, kanamaya eğilim	Koagülometrik	Ertesi gün saat 18:00	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
750	L107550	*Von Willebrand Faktör Antijeni	Numune tipi - Miktarı Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) Sıcaklık - Zaman Dondurulmuş - 14 gün	von Willebrand sendromu, kanamaya eğilim	Koagülometrik	Ertesi gün saat 18:00	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
751	905674	Yara Kültürü	Numune tipi - Miktarı Kültür Materyali Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün Ortam - 1 gün	Cilt enfeksiyonları	Kültür	Hafta içi her gün (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 gün sonra saat 18.00
752	L107610	*Yenidoğan Taraması (Tandem MS)	Numune tipi - Miktarı Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire) Not: Erken teşhisin faydasını en üst düzeye çıkarmak için, örnek 12 saatten sonra ve 1 haftalıktan önce mümkün olduğunca erken toplanmalıdır. Sıcaklık - Zaman Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün Dondurulmuş - 14 gün Ortam - 7 gün	Neonatal tarama, yenidoğan metabolizma bozuklukları	LC-MS/MS	Pazartesi-Cuma (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

(*) ile işaretlenmiş testler başvuru laboratuvarında çalışılmaktadır.

(^) işareti olan testler TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 Standardına göre Akredite edilmiştir.